

مجموعه سؤالات بورد دندانپزشکی DBQ تشخیص و بیماری‌های دهان

گردآوری و تألیف:

دکتر کوثر رضایی فر

(متخصص بیماری‌های دهان فک و صورت)

رضایی فر، کوثر، ۱۳۶۸-	سرشناسه
مجموعه سوالات بورد دندانپزشکی DBQ تشخیص و بیماری‌های دهان/گردآوری و تألیف کوثر رضایی فر.	عنوان و نام پدیدآور
[ویراست ۲].	وضعیت ویراست
تهران: شایان نمودار، ۱۴۰۰.	مشخصات نشر
۱۷۴ص.	مشخصات ظاهری
۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۶۱۲-۴	شابک
فیفا	وضعیت فهرست نویسی
دهان -- بیماری‌ها -- آزمون‌ها و تمرین‌ها	موضوع
Mouth -- Diseases -- Examinations, questions, etc	موضوع
دندان -- بیماری‌ها -- آزمون‌ها و تمرین‌ها	موضوع
.Teeth -- Diseases -- Examinations, questions, etc	موضوع
دندانپزشکی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها	موضوع
.Dentistry -- Examinations, questions, etc	موضوع
RK۳۰۷	رده بندی کنگره
۶۱۷/۵۲۲۰۷۶	رده بندی دیویی
۷۵۷۹۳۴۹	شماره کتابشناسی ملی

نام کتاب: مجموعه سوالات بورد دندانپزشکی DBQ تشخیص و بیماری‌های دهان

گردآوری و تألیف: دکتر کوثر رضایی فر

ناشر: انتشارات شایان نمودار

مدیر تولید: مهندس علی خزعلی

حروف چینی و صفحه آرایی: انتشارات شایان نمودار

طرح جلد: آتلیه طراحی شایان نمودار

نوبت چاپ: اول

شمارگان: ۵۰۰ جلد

تاریخ چاپ: بهار ۱۴۰۰

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۶۱۲-۴

قیمت: ۶۸۰،۰۰۰ ریال



شایان نمودار

دفتر مرکزی: تهران/ میدان فاطمی/ خیابان چهلستون/ خیابان دوم/ پلاک ۵۰/ بلوک B/ طبقه همکف/ تلفن: ۸۸۹۸۸۸۶۸



وب سایت: shayannemoodar.com



اینستاگرام: Shayannemoodar

(تمام حقوق برای ناشر محفوظ است. هیچ بخشی از این کتاب، بدون اجازه مکتوب ناشر، قابل تکثیر یا تولید مجدد به هیچ شکلی، از جمله چاپ،

فتوکپی، انتشار الکترونیکی، فیلم و صدا نیست. این اثر تحت پوشش قانون حمایت از مولفان و مصنفان ایران قرار دارد.)

فهرست مطالب

۵۵	مجموعه سوالات آزمون ورود سال ۱۳۹۵
۲۲	پاسخنامه سوالات ورود سال ۱۳۹۵
۵۰	مجموعه سوالات آزمون ورود سال ۱۳۹۶
۶۸	پاسخنامه سوالات ورود سال ۱۳۹۶
۹۸	مجموعه سوالات آزمون ورود سال ۱۳۹۷
۱۱۴	پاسخنامه سوالات ورود سال ۱۳۹۷
۱۳۷	مجموعه سوالات آزمون ورود سال ۱۳۹۸
۱۵۱	پاسخنامه سوالات ورود سال ۱۳۹۸

مجموعه سوالات امتحان مورد سال ۹۵

۱. خانم ۶۶ ساله ای به علت سوزش دو طرفه زبان مراجعه می‌کند. در معاینه، زبان نرمال به نظر می‌رسد. یافته های آزمایشگاهی بیمار نیز طبیعی است. بیمار به علت آریتمی قلبی، پرفشاری خون و آنژین پایدار تحت درمان با پروپرانولول، نیتروکانتین و آسپیرین قرار دارد. کدام پروتکل برای کنترل علائم این بیمار مناسب تر است؟

- الف) کاربامازپین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم دو بار در روز
 ب) آمی تریپتیلین ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم سه بار در روز
 ج) پرگابالین ۵۰ تا ۲۰۰ میلی گرم سه بار در روز
 د) فلوکستین ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم دو روز بعد از صبحانه

۲. بیماری که از نظر سیستم ایمنی سالم است، به علت هرپس عود کننده ی لب مراجعه می‌کند. در معاینه چند وزیکول به صورت خوشه ای بر روی زمینه اریتماتوز و کراست مشاهده می‌شود. کدام درمان برای این بیمار توصیه می‌شود؟

- الف) پرهیز از دستکاری و استفاده از ترکیبات محافظ موضعی
 ب) Famciclovir ۱۵۰۰ میلی گرم فقط یک نوبت
 ج) Valacyclovir دو گرم در دو دوز منقسم در یک روز
 د) کرم آسیکلوویر ۵ درصد ۵ بار در روز تا زمان التیام

۳. برای آبسه دندانی مردی ۵۸ ساله که دارای پیوند کلیه می باشد، سیپروفلوکساسین تجویز شده است. کدام دارو جهت پیشگیری از بروز کاندیدیازیس دهانی اولیه توصیه می‌شود؟

- الف) دهان شویه نیستاتین
 ب) قرص مکیدنی کلوتریمازول
 ج) قرص خوراکی فلوکونازول
 د) محلول ایتراکونازول

۴. کدام داروی زیر آگونیست رسپتورهای ملاتونین محسوب می‌شود و شروع خواب را تسهیل می‌کند؟

- الف) Remelteon ب) Zolpidem ج) Clonazepam د) Eszopiclone

۵. فرد مبتلا به ایدز که از یک ماه پیش در محیط ایزوله قرار گرفته، دچار استئونکروز مندیبل چپ، تحلیل ریشه و افتادن دندان ها شده است. با توجه به احتمال ترین علت بالینی، کدام دارو برای درمان این بیمار مناسب است؟

- الف) فام سیکلوویر ب) آمفوتریسین B ج) کورتون سیستمیک د) کلیندامایسین

۶. تمام موارد جز عوامل مستعد کننده نسبت به پست هرپتیک نورالژیا محسوب می شوند، بجز :

- (الف) سن بالاتر از ۵۰ سال در زمان بروز زوستر
 (ب) محل (درماتوم) درگیری
 (ج) شدت بیماری در فاز حاد زوستر
 (د) وجود درد در فاز پیش رس بیماری

۷. کودک ۱۱ ساله از سه روز پیش دچار گلودرد، احساس کسالت، تب، آدنوپاتی دردناک گردن و اسپلنومگالی خفیف شده است. در معاینه چند پتشی در کام و دو زخم کوچک آفت مانند در مخاط لب و زبان دیده می شود. تمام ویروس ها به عنوان علت علایم بیمار مطرح می شوند، بجز :

- (الف) Epstein-Barr (ب) Cytomegalovirus (ج) HHV-6 (د) HHV-8

۸. بیمار مبتلا به لوسمی حاد دچار زخم مزمنی در گونه شده است. در معاینه، زخمی بزرگ با حاشیه Scalloped دیده می شود که در اطراف آن چند زخم کوچک اقماری وجود دارد. در نمونه اینسیژنال حاشیه زخم، دژنرسانس بالونینگ، انکلوزیون های داخل هسته ای و سلول ژانت چند هسته ای گزارش شده است. کدام روش تشخیص از ارزش کمتری برخوردار است؟

- (الف) کشت بافتی
 (ب) Real-time PCR
 (ج) برداشت نمونه با سواپ و رنگ آمیزی Giemsa
 (د) اسمیر سیتولوژی با رنگ آمیزی ایمونوفلورسنت

۹. خانم ۴۵ ساله با شکایت از زخم های متعدد با قطر متوسط ۵-۶ میلی متر در کف دهان، گونه ها و سطح داخلی لب ها مراجعه کرده که از چند ماه پیش شروع شده است. زخم ها پس از مدتی بهبود می یابند و دوباره بروز می کنند. بررسی کدام مورد در اولویت قرار دارد؟

- (الف) آهن، فولات و فریتین سرم
 (ب) تعداد سلول های CD4
 (ج) وجود بیماری های التهابی روده
 (د) بیوپسی برای رد پمفیگوئید مخاطی

۱۰. برای خانم ۳۰ ساله ی متاهل، به علت ابتلا به آفت های مازور مقاوم به درمان، تالیدومید تجویز شده است. کدام مورد ضرورت دارد؟

- (الف) ارزیابی ماهانه ذخایر آهن
 (ب) درخواست ادواری CBC برای بررسی سیتوپنی
 (ج) تاکید بر استفاده همزمان از دو روش ضد بارداری و تست ماهانه بارداری
 (د) معاینه دوره ای دهان جهت کشف زود هنگام ابتلا به نئوپلاسم

۱۱. بر اساس معیارهای جدید، تشخیص سندرم بهجت در یک مرد ۳۵ ساله، در کدام مجموعه از علائم کمتر از بقیه مطرح می‌شود؟

الف) زخم‌های دهانی و تناسلی عود کننده

ب) زخم‌های تناسلی عود کننده و Uveitis

ج) اریتمانودوزوم، علائم سندرم ساقه مغز و واسکولیت شبکیه

د) زخم‌های دهانی عود کننده، تست Pathergy مثبت و HLA-B51

۱۲. بیمار ۶۵ ساله به علت آریتمی قلبی تحت درمان با Amiodarone قرار گرفته است. پس از مدتی، وی با ضایعات تاولی و ژنژیویت دسکوآماتیو مراجعه می‌کند. در بیوپسی، تاول حاوی نوتروفیل مشاهده می‌شود. IIIF وی نیز منفی گزارش شده است. محتمل‌ترین تشخیص کدام است

الف) Pemphigus Vulgaris

ب) Mucous Membrane Pemphigoid

ج) Linear IgA Disease

د) Drug-induced Stomatitis

۱۳. مرد ۵۳ ساله از دو ماه پیش دچار ضایعات بولوز گسترده شده است. ضایعات از مخاط دهان شروع شده‌اند و پس از ۳ روز به پوست گسترش یافته‌اند. در حال حاضر، بیمار دچار تنگی نفس، سرفه دردناک و قرمزی چشم‌ها نیز شده است. IIIF نشانگر آنتی‌بادی بر علیه اپی‌تلیوم قلب و کلیه می‌باشد. با شروع درمان کدام قسمت پاسخ بهتری نشان خواهد داد؟

الف) پوست

ب) مخاط دهان

ج) دستگاه تنفس

د) چشم

۱۴. بررسی ایمونوفلورسنت ضایعه مخاطی به روش Salt-split در خانم ۵۵ ساله که دچار زخم‌های دهانی و تاول‌های پوستی مزمن شده است، رسوب ایمونوگلوبولین را در سمت اپی‌درمال نمونه نشان می‌دهد. کدام تشخیص بالینی در این بیمار بطور قطع منتفی است؟

الف) Mucous Membrane Pemphigoid

ب) Bullous Pemphigoid

ج) Linear IgA Dermatitis

د) Epidermolysis Bullosa Acquisita

۱۵. تمام موارد زیر در مورد ویژگی‌های PVL صدق می‌کند، بجز:

الف) ممکن است به صورت لکوپلاکیای هموزن شروع شود

ب) معمولاً در خانم‌های مسن رخ می‌دهد

ج) لته پایین جایگاه شایع آن است

د) نقش HPV در ایجاد آن تایید شده است

۱۶. مرد ۶۰ ساله با سابقه ابتلا به آسم به علت ضایعه اریتماتوی خط وسط قسمت عقب زبان مراجعه می کند. تمام عوامل به عنوان ریسک فاکتور این ضایعه محسوب می شوند، بجز :

الف) سیگار (ب) دنچر (ج) اسپری بکلومتازون (د) الکل

۱۷. طول مدت کورتیکواستروئید تراپی موضعی لیکن پلان دهانی اروزو آتروفیک تا رسیدن به دوز نگهدارنده چند هفته است؟

الف) ۴ (ب) ۸ (ج) ۱۰ (د) ۱۲

۱۸. خطر تغییر بدخیمی در کدامیک از ضایعات لیکنوئیدی بیشتر است؟

الف) لوپوس اریتماتوی دیسکوئید (ب) لیکنوئید یک طرفه تماسی
ج) بیماری میزبان علیه پیوند (د) واکنش دارویی اروزو آتروفیک منتشر

۱۹. مرد ۴۹ ساله سیگاری با کراتینین ۳,۵ و کاندیدیازیس ندولر دهانی مراجعه کرده است. تمام داروها را می توان تجویز کرد، بجز :

الف) Miconazole (ب) Ketoconazole (ج) Fluconazole (د) Itraconazole

۲۰. اسمیر به تشخیص همه ضایعات کمک می کند، بجز :

الف) Angular Cheilitis (ب) Hereditary Mucoepithelial Dysplasia
ج) Necrotizing Ulcerative Gingivitis (د) Histoplasmosis

۲۱. شایعترین ضایعه مخاطی در افراد سیگاری و الکلی کدام است؟

الف) Plaque-like Candidiasis (ب) Frictional Hyperkeratosis
ج) Homogeneous Leukoplakia (د) Nonhomogeneous Leukoplakia

۲۲. خانم ۲۳ ساله به علت ماکول قهوه ای تیره دو سانتی متری در مخاط گونه که سریعاً در حال بزرگ شدن می باشد، مراجعه نموده است. دندان های مجاور ضایعه پوسیده و شکسته هستند.

بهترین تشخیص کدام است؟

الف) نووس ملانوسیتیک (ب) ماکول ملانوتیک (ج) ملانواکانتوما (د) ملانوما

۲۳. همه خصوصیات بالینی و هیستولوژیک نشانه پیش آگهی ضعیف ملانوم دهانی هستند، بجز :

- الف) ضخامت تومور بیشتر از ۵ میلیمتر
ب) نفوذ به عروق لنفاوی
ج) حضور ضایعه در کام
د) بروز در دوره بارداری

۲۴. کدام عبارت درباره ی ملانوزیس دارویی صحیح است؟

- الف) ممکن است به صورت پلاک مخاطی ظریف پیگمانته بروز کند
ب) معمولاً پس از قطع داروی مسبب بر جا می ماند
ج) ضایعات دهانی اغلب بصورت منفرد و تک کانونی بروز می کنند
د) ضایعات پوستی با تابش آفتاب تیره تر می شوند

۲۵. علت پیگمانتاسیون منتشر در کدام مورد می تواند غیر ملانوسیتی باشد؟

- الف) Vit B12 Deficiency
ب) Primary Biliary Cirrhosis
ج) Grave's Disease
د) Laugier-Hunziker Pigmentation

۲۶. مرد ۳۱ ساله ی به ظاهر سالم به علت گره لنفاوی بسیار سفت، بی درد و غیر متحرک که از حدود یک ماه قبل در قسمت فوقانی زنجیره گردنی راست ظاهر شده، مراجعه نموده است. ژنوم EBV در FNA کشف شده است. کدام تشخیص محتمل تر است؟

- الف) لنفوم بورکیت
ب) کارسینوم نازوفارنکس
ج) لنفوم غیر هوچکینی در عفونت HIV
د) آدنوکارسینوم متاستاتیک دستگاه گوارش

۲۷. عفونت حاد پریدنتال در بیماری که دچار میلوپارنشن است، اغلب به چه شکل بروز می کند؟

- الف) درناژ چرک از سالکوس لثه
ب) اکستروژن دندان از حفره ی آلونل
ج) اریتم لثه همراه با تورم نسبی و درد شدید
د) فقدان علائم در اکثر موارد

۲۸. تمام گزینه ها درباره ی مراقبت از دهان در دوره شیمی درمانی و پرتودرمانی سر و گردن صحیح است، بجز :

- الف) با توجه به ریسک موکوزایتیس، عفونت و شکنندگی مخاط، کلرهگزیدین باید جایگزین مسواک شود
ب) نخ دندان به صورت غیر تروماتیک روزی یکبار در فاز فعال درمان کفایت می کند
ج) ژل فلوراید به مدت ۵ دقیقه قبل از خواب در صورت کاهش فانکشن بزاقی توصیه می شود
د) خمیر دندان حاوی Surfactant یا اسانس نعنای در صورت عدم تحریک مخاط دهان بلا مانع است

۲۹. غربال گری قبل از ۵۰ سالگی برای سرطان کولورکتال در کدام مورد زیر توصیه می شود؟

- (الف) استعمال دخانیات بیش از ۲۰ سال
(ب) سابقه خانوادگی هرگونه سرطان در بستگان درجه یک
(ج) سابقه ابتلا فرد به Inflammatory Bowel Disease
(د) مصرف بیش از حد NSAID ها

۳۰. تصویر برداری تشخیصی انتخابی برای تعیین تغییرات آناتومیک مجرای غده بزاقی کدام است؟

- (الف) Sialography (ب) Scintigraphy (ج) Ultrasonography (د) MRI

۳۱. بهترین دارو برای کنترل خشکی دهان و چشم در خانم ۴۷ ساله ی مبتلا به اسکلوئودرمی و

فیبروز ریه کدام است؟

- (الف) برم هگزین (ب) پیلوکارپین (ج) سویمیلین (د) آمیفوستین

۳۲. مرد ۵۲ ساله پس از بیهوشی عمومی، دچار تورم یک طرفه ناحیه بناگوشی شده است. بیمار

تب ندارد و ترشح بزاق پاروتید زلال می باشد. دارو درمانی مناسب کدام است؟

- (الف) Cloxacillin (ب) Acyclovir (ج) NSAIDs (د) Loratadine

۳۳. تورم دو طرفه، سیمتربیک و بدون درد پاروتید همراه با ابتلا چشم در تمام بیماری های زیر

ممکن است مشاهده شود، بجز :

- (الف) Sjogren Syndrome (ب) Mikulicz's Disease
(ج) Wegener's Granulomatosis (د) Heerfordt's Syndrome

۳۴. یکی از گزینه ها درباره آناتومی فانکشنال مفصل فک اشتباه است، آن را مشخص کنید :

- (الف) هایپراکتیویته سر فوقانی عضله لترال تریگوئید، علت اصلی جابجایی قدامی دیسک می باشد
(ب) انقباض یک طرفه ی عضله مدیال تریگوئید در حرکت طرفی فک به سمت مقابل دخالت دارد
(ج) کلیک در سمع مفصلی که دیسک آن در محل طبیعی قرار دارد، ممکن است شنیده شود
(د) عصب اوریکولوتمپورال، علی رغم آسیب در جریان جا بجایی دیسک، نقش چندانی در علائم TMD ندارد.

۳۵. مرد ۲۲ ساله دو روز بعد از ترمیم مولر سمت چپ، به علت درد و تغییر اکلوزن مراجعه می کند. در

معاینه نقطه ای براق بر روی آمالگام دندان ترمیم شده دیده می شود. بررسی اکلوزن نشان می دهد که دندان های خلفی بیمار در سمت راست به هم نمی رسند. میزان باز شدن دهان بیمار بدون

کمک در حدود ۴۲ میلی متر می باشد. محتمل ترین تشخیص، درد مایوفسیال کدام عضله است؟

الف) ماستر چپ (ب) لترال تریگوئید چپ

ج) ماستر راست (د) لترال تریگوئید راست

۳۶. مرد ۴۵ ساله از دو روز پیش دچار درد شدید مفصل گیجگاهی فکی چپ و محدودیت در باز کردن دهان

شده است. مفصل مبتلا قرمز، متورم و دردناک است. مناسب ترین اقدام برای این بیمار کدام است؟

الف) آسپیراسیون و کشت مایع (ب) CBCT از مفصل مبتلا

ج) آنتی بیوتیک وریدی و درناژ (د) تزریق داخل مفصلی استروئید

۳۷. برای درمان اختلال مفصل گیجگاهی فکی بیماری، اسپلینتی ساخته شده است که فک پایین

را به سمت جلو هدایت می کند. این درمان در دراز مدت سبب کدام اختلال می شود؟

الف) افزایش فعالیت عضله جونده (ب) قفل شدگی فک

ج) تغییر دائمی اکلوزن (د) انکیلوز مفصل فک

۳۸. بر اساس شواهد محل شروع درد در انواع مختلف Trigeminal Autonomic Cephalgia کدام

قسمت مغز است؟

الف) عروق خونی مننژ (ب) هیپوتالاموس (ج) پل دماغی (د) بصل النخاع

۳۹. خانم ۳۳ ساله دچار دردی شده است که روزی ۸ تا ۱۰ بار بصورت خود بخود در گونه و اطراف چشم چپ رخ

می دهد. درد سوزشی و گاهی تیر کشنده و بسیار شدید است. بیمار همزمان با درد دچار آبریزش و قرمزی چشم

همان سمت می شود. درد معمولاً پس از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه خود بخود برطرف می شود و بندرت در زمان خواب رخ می

دهد. دندان های مولر بالا کشیده شده اند اما درد کاهش نیافته است. مناسب ترین درمان کدام است؟

الف) کاربامازپین (ب) ایندومتاسین (ج) وراپامیل (د) آمی تریپتیلین

۴۰. خانم ۴۵ ساله به دنبال خارج نمودن دندان مولر پایین در ۴ ماه قبل، دچار بی حسی، درد و

سوزش مداوم فک و دندان های فک پایین شده است. در معاینه، حس لب طبیعی است ولی لمس

لب و پوست ناحیه ی چانه همان سمت باعث تشدید درد و سوزش می گردد. تمام داروها با مقادیر

ارائه شده جهت شروع درمان می توانند تجویز شوند، بجز :

الف) گاباپنتین، ۱۰۰mg سه بار در روز (ب) ونلافاکسین، ۳۷.۵mg یکبار در روز

ج) پرگابالین، ۵۰mg سه بار در روز (د) آمی تریپتیلین، ۷۵mg قبل از خواب

۴۱. کدام دارو ممکن است باعث تشدید علائم در بیمار مبتلا به سندرم سوزش دهان شود؟

- الف) دهان شویه دیفن هیدرامین
ب) کلونازپام
ج) آلفالیپولیک اسید
د) فلوکستین

۴۲. خط اول پروفیلاکسی در سردرد خوشه ای کدام است؟

- الف) اکسیژن
ب) کورتیکواستروئید
ج) سوماتریپتان
د) والپروئیک اسید

۴۳. خانم ۵۲ ساله به علت احساس خستگی عمومی و درد عضلات ماستر و تمپورال راست در هنگام جویدن غذا با سیر یک هفته ای مراجعه می کند. بیمار بیان می کند که گاهی بر اثر درد و خستگی عضلات، از جویدن غذا باز می ماند. آزمایش های بیمار که توسط پزشک درخواست شده است، نشان می دهد که CRP مثبت، میزان ESR و آلکالن فسفاتاز و آنزیم های کبدی افزایش یافته است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

- الف) Fibromyalgia
ب) Myasthenia Gravis
ج) Giant Cell Arteritis
د) Dermatomyositis

۴۴. کدام ضایعه ممکن است به صورت خودبخودی و بدون درمان بهبود پیدا کند؟

- الف) Buccal Bifurcation cyst
ب) Residual Cyst
ج) Dentigerous Cyst
د) Lateral Periodontal Cyst

۴۵. Keratocystic Odontogenic tumor در کدام ناحیه آناتومیک از فک پایین، باعث تورم شدید می شود؟

- الف) بخش تحتانی راموس
ب) کروئوئید
ج) تنه مندیبل
د) زاویه مندیبل

۴۶. بهترین تشخیص یک ضایعه رادیولوسنت اطراف تاج دندان عقل نهفته پایین با کلسیفیکاسیون

های Crescent shape در خانم ۵۲ ساله که دچار تورم استخوان ناحیه می باشد، کدام است؟

- الف) Calcifying Epithelial Odontogenic Tumor
ب) Ameloblastic Fibro-Odontoma
ج) Odontogenic Myxoma
د) Calcifying Cystic Odontogenic Tumor

۴۷. همه موارد در تشخیص بالینی و رادیولوژیک رادیولوسنسی کوچک و بدون علامت در اطراف تاج

دندان رویش نیافته ی مولر اول پسری ۹ ساله مطرح می باشند، بجز :

- الف) آمولوبلاستیک فیبروما
ب) سیست دنتی ژروس
ج) فولیکول هیپرپلاستیک
د) آمولوبلاستیک فیبرودانتوما

۴۸. نتیجه ی آسپیراسیون در همه موارد ممکن است مثبت باشد، بجز :

- الف) Calcifying Cystic Odontogenic Tumor (ب) Odontogenic Myxoma
 ج) Aneurysmal Bone Cyst (د) Ameloblastoma

۴۹. تمام ضایعات زیر می توانند پس از سوراخ کردن کورتکس، قوام مواج ایجاد کنند، بجز :

- الف) Calcifying Cystic Odontogenic Tumor (ب) Central Giant Cell Granuloma
 ج) Ameloblastoma (د) Langerhan's Cell Histiocytoma

۵۰. گزارش تومور ژانت سل در نمونه تهیه شده از ضایعه ی استخوان فک بیماری پنجاه ساله،

احتمال تشخیص کدام مورد را افزایش می دهد؟

- الف) آنوریسمال بن سیست (ب) هیپرپاراتیروئیدیسم (ج) چروبیسم (د) بیماری پاژه

۵۱. تمام ضایعات به صورت انحصاری در لته یا مخاط آلونولار پدیدار می شوند، بجز :

- الف) اپولیس گرانولوماتوز (ب) ژانت سل گرانولومای محیطی
 ج) فیبروم اسیفیه محیطی (د) پیوژنیک گرانولوما

۵۲. مرد ۲۲ ساله به علت پاپول های کوچک Flat-topped در کام سخت که برخی هم رنگ مخاط

و برخی سفید و کراتوتیک هستند، به شما معرفی می شود، علاوه بر این پاپول های سرخ و خارش

دار با بوی ناخوشایند در پوست سر و قفسه ی سینه بیمار دیده می شود. محتمل ترین تشخیص

کدام است؟

- الف) Acanthosis Nigracans (ب) Tuberos Sclerosis
 ج) Darier Disease (د) Cowden Syndrome

۵۳. در معاینه دهان خانم ۳۰ ساله، پاپول های ۲-۳ میلی متری با سطح صاف، رنگ صورتی و قوام

سفت بر روی لته، گونه و زبان به صورت منتشر دیده می شود. هیپرکراتوز کف دست و پا نیز توجه

را جلب می کند. نمونه ی بافتی ضایعه دهانی بعنوان هیپرپلازی فیبروآپی تلیال گزارش می شود. با

توجه به محتمل ترین تشخیص، ارزیابی تمام ارگان های زیر برای کشف زودهنگام سرطان توصیه

می شود، بجز:

- الف) پستان (ب) تیروئید (ج) دستگاه گوارش (د) کلیه

۵۴. تمام گزینه‌ها درباره ی **Melanotic Neuroectodermal Tumor of Infancy** صدق می‌کند، بجز :

- (الف) تقریباً همیشه در سال اول زندگی بروز می‌کند
 (ب) قسمت قدامی مندیبل شایعترین مکان بروز است
 (ج) Vanillylmandelic Acid در ادرار یافته می‌شود
 (د) به صورت توده ای با رشد سریع به رنگ آبی یاسیاه می‌باشد

۵۵. بررسی یک ضایعه ندولر، غیر متحرک و بی درد در سطح دورسال زبان مرد ۳۶ ساله که مخاط نرمال زبان آن را می پوشاند. نشان دهنده ی حضور پروتئین **S-100** در نمونه است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

- (الف) ملانوم آملانوتیک (ب) انوزینوفیلیک گرانولوما (ج) گرانولر سل تومور (د) رابدومیوما

۵۶. کدام واژه برای توصیف تغییرات دندان‌ی در بیماری که مبتلا به **Bulimia** می باشد، صحیح است؟

- (الف) Attrition (ب) Abrasion (ج) Erosion (د) Abfraction

۵۷. در رادیوگرافی کودک ۶ ساله، پالپ وسیع در ناحیه تاج و ریشه دندان های شیری مشاهده می‌شود. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

- (الف) آملوژنزیس ایمپرکتا (ب) دنتینوژنزیس ایمپرکتا
 (ج) دنتین دیسپلازی نوع یک (د) ادونتودیسپلازی ناحیه ای

۵۸. مرد ۲۳ ساله دارای دریچه مصنوعی قلب به علت سینوزیت ماگزیلاری از ۷ روز قبل تحت درمان با آموکسی سیلین قرار دارد. وی به علت تروما دچار شکستگی دندان شده و لازم است دندان مزبور کشیده شود. بر اساس کتاب فالاس، کدام آنتی بیوتیک برای پروفیلاکسی ارجحیت دارد؟

- (الف) آموکسی سیلین (ب) سفالکسین (ج) آزیترومایسین (د) اریترومایسین

۵۹. مرد ۴۰ ساله ای مبتلا به نارسایی قلبی و دارای پروتز دریچه میترا و سابقه دو بار سکته قلبی برای کشیدن دندان مراجعه کرده است. اگر بیماری وی تحت کنترل باشد، کدام مورد صحیح است؟

- (الف) بیمار در طول درمان باید در حالت سوپاین باشد (ب) بی حسی کامل و حفظ آن بسیار مهم است
 (ج) قطع داروی ضد پلاکت قبل از درمان ضروری است (د) به پروفیلاکسی آنتی بیوتیک نیاز ندارد

۶۰. ریسک افزایش فشار خون در مصرف همزمان اپی نفرین موجود در داروی بی حسی با کدام دارو بیشتر است؟

الف) لازیکس ب) تنورمین ج) پروپرانولول د) آدالات

۶۱. بیمار ۲۲ ساله دارای **Pace maker** برای جراحی دندان عقل نهفته مراجعه می‌کند. تمام موارد درباره‌ی ملاحظات دندانپزشکی بیمار صدق می‌کند، بجز:

الف) احتیاج به پروفیلاکسی آنتی بیوتیک ندارد ب) تجویز آموکسی سیلین و مترونیدازول ممنوع است
ج) استفاده از دو کارپول محتوای آدرنالین بلامانع است د) پروفیلاکسی با بنزودیازپین توصیه می‌شود

۶۲. تظاهر دهانی نارسایی قلبی در بیماران بدون مصرف دارو بر اساس کتاب فالاس کدام است؟

الف) خشکی دهان ب) سیانوز لب‌ها ج) سیالوره د) بی علامت

۶۳. تمام علائم نشانه‌ی **Right Ventricular Failure** هستند، بجز:

الف) اتساع وریدهای گردنی ب) تنگی نفس در هنگام استراحت
ج) ادم اندام تحتانی د) هیپاتومگالی

۶۴. بیمار ۶۸ ساله **Heavy Smoker** با سابقه طولانی سرفه‌های مکرر توام با خلط، برای درمان ریشه‌ی دندان ۷ بالا مراجعه کرده است. تمام موارد در این بیمار صدق می‌کند، بجز:

الف) استفاده از بی حسی مشابه افراد سالم ب) قرار دادن بیمار در وضعیت نیمه نشسته
ج) عدم استفاده از داروهای آرام بخش د) اندازه‌گیری فشار خون قبل از درمان

۶۵. دختر ۱۰ ساله مبتلا به آسم با سابقه استفاده طولانی مدت از سالمترول مراجعه کرده است، امکان بروز تمام موارد در این بیمار زیاد است، بجز:

الف) خشکی دهان ب) پوسیدگی‌های دندانی ج) بیماری‌های پریدنتال د) عفونت کاندیدا

۶۶. کودک ۵ ساله مبتلا به سل بدون **Cavitation** که مدتی است تحت درمان با داروی ضد سل می‌باشد، برای درمان دندانپزشکی مراجعه کرده است. کدام مورد صدق می‌کند؟

الف) انجام تست توبرکولین قبل از درمان ب) انجام درمان در اتاق ایزوله
ج) استفاده از دو لایه ماسک د) درمان مشابه افراد سالم

۶۷. تمام گزینه ها درباره ی فازهای مختلف خواب صحیح است، بجز :

- الف) رویا دیدن معمولاً در فاز REM اتفاق می افتد
 ب) رفع خستگی فیزیکی در فاز NREM رخ می دهد.
 ج) خواب از فاز NREM آغاز و سپس وارد فاز REM می شود.
 د) در فاز NREM مغز فعال و عضلات فلج می باشند.

۶۸. خانم ۳۸ ساله با کبد چرب Grade2 و ALT و AST بالای ۱۰۰ به علت درد و تورم دندان مراجعه کرده است. تجویز کدام دارو مجاز می باشد؟

- الف) آموکسی سیلین ب) ایبوپروفن ج) مترونیدازول د) کلیندامایسین

۶۹. نتیجه آزمایشات برای بیمار شامل: +HBS Ah, +HBe Ag, (Anti HBC+ IgG), ALT و AST بیشتر از حد طبیعی می باشد. کدام عارضه کبدی برای وی مطرح است؟

- الف) هپاتیت ویروسی حاد ب) هپاتیت فولمیننت
 ج) ناقل مزمن بدون علامت د) هپاتیت مزمن فعال

۷۰. خانم ۴۲ ساله، مبتلا به سیروز کبدی، که در نوبت دریافت پیوند کبد می باشد، به علت درد و تورم دندان مراجعه کرده است. رعایت کدام مورد مهم است؟

- الف) وضعیت صندلی دندانپزشکی ب) پروفیلاکسی آنتی بیوتیک
 ج) پایش فشارخون د) بررسی وضعیت تنفسی

۷۱. مرد ۳۸ ساله مبتلا به Peptic ulcer Disease که تحت درمان با Al-Mgs می باشد، برای انجام درمان دندانپزشکی مراجعه کرده است. از تمام موارد در درمان دندانپزشکی وی باید اجتناب نمود، بجز :

- الف) درمان های دندانپزشکی طولانی مدت ب) همزمانی تجویز اریترومایسین با آنتی اسید
 ج) قرار دادن صندلی در حالت سوپاین د) تزریق بی حسی حاوی آدرنالین

۷۲. کدام درمان منجر به بهبود کامل پیواستوماتیت وژتان می شود؟

- الف) کولونکتومی ب) پردنیزولون ج) سولفاسالازین د) آزاتیوپرین

۷۳. خطر ابتلا به کولیت سدوممبرانو به دنبال مصرف خوراکی کدام آنتی بیوتیک بیشتر است؟

- الف) کلیندامایسین ب) سفالکسین ج) آمپی سیلین د) اریترومایسین

۷۴. در مورد استفاده از استامینوفن در بیماران کلیوی تمام عبارات زیر صحیح است، بجز :

- الف) نفروتوکسیسیتی آن از اسپرین کمتر است
ب) در دوز بالا قابلیت نکروز توبولار کلیوی دارد
ج) در کبد متابولیزه می‌شود
د) با همودیالیز قابل برداشت می‌باشد

۷۵. در موارد نیاز به جراحی اورژانس با فاصله زمانی کم از همودیالیز، تمام گزینه‌ها جهت کنترل خونریزی موثر هستند، بجز :

- الف) بستن اولیه زخم
ب) پروتامین سولفات
ج) همودیالیز بدون هپارین
د) استروژن کنژوگه

۷۶. میزان انفیلتراسیون گلوومرولی در خانمی ۶۲ ساله ۸ میلی لیتر در دقیقه است. تجویز کدام دارو ممنوع است؟

- الف) ایبوپروفن
ب) فلوکونازول
ج) استامینوفن
د) پنی سیلین V

۷۷. امکان بروز تمام ضایعات در دهان به شکل خود تلقیحی وجود دارد، بجز :

- الف) گوم سیفلیس
ب) هرپتیک ویتلو
ج) زگیل ویروسی
د) کندیلوما آکومیناتوم

۷۸. بیمار مبتلا به دیتبا حین انجام درمان‌های دندانپزشکی دچار علائمی شامل گیجی، تعریق، لرزش، اضطراب، سرگیجه، تحریک پذیری و تاکی کاردی شده است. بهترین روش برای کنترل علائم کدام است؟

- الف) نوشاندن شربت حاوی کربوهیدرات
ب) تجویز اکسیژن خالص
ج) سوپاین کردن بیمار و بالا نگه داشتن پاها
د) انفوزیون وریدی نرمال سالین

۷۹. احتمال مقاومت آنتی باکتریال نسبت به کدام دارو در آنتی بیوتیک تراپی ترکیبی استئونکروز فک ناشی از بیس فسفونات بیشتر از بقیه است؟

- الف) آموکسی سیلین
ب) مترونیدازول
ج) کلیندامایسین
د) تتراسایکلین

۸۰. بیماری که از سال‌ها پیش دچار کم کاری تیروئید تحت کنترل می‌باشد، جهت کشیدن مولر اول فک پایین و جایگزین کردن آن با ایمپلنت مراجعه کرده است. رعایت کدام مورد برای وی ضروری است؟

- الف) تزریق فاقد آدرنالین و کنترل فشار خون
ب) پروفیلاکسی آنتی بیوتیک و عدم تجویز NSAID
ج) منع تجویز ایمپلنت
د) درمان دندانپزشکی مشابه افراد سالم

۸۱. کدام مورد بر اساس کتاب برکت بیشترین اثر در کوتاه کردن طول عمر ایمپلنت دارد؟

الف) دیابت ملیتوس (ب) کسیدن سیگار (ج) سن بالا (د) هیپوتیروئیدی

۸۲. کدام آنتی بادی برای بیماری Graves پاتوگنومیک می باشد؟

الف) TSHR (ب) Thyroid Peroxidase Enzyme
ج) Thyroglobulin (د) TSH

۸۳. خانم بارداری در ماه نهم چند دقیقه پس از شروع درمان دندانپزشکی دچار کاهش سطح

هوشیاری، تاکی پنه و تپش قلب شده است. بهترین روش کنترل این وضعیت کدام است؟

الف) خواباندن بیمار به سمت چپ (ب) تزریق سرم دکستروز - سالین
ج) بالاتر قرار دادن پاها نسبت به سر (د) تنفس داخل پاکت کاغذی

۸۴. مرد ۴۳ ساله با سابقه اعتیاد تزریقی، از دو هفته پیش دچار تب، خستگی مفرط، فارنژیت،

آدنوپاتی گردن و چند زخم آفت مانند در دهان و ناحیه تناسلی شده است. کدام آزمایش برای رد

عفونت HIV توصیه می شود؟

الف) HIV Ab/Ag Combo Immunoassay (ب) Anti-HIV به روش ELISA
ج) Western Blot Immunofluorescence Assay (د) Polymerase Chain Reaction(PCR)

۸۵. اتساع مویرگ های لثه، تلانژکتازی مویرگ های اطراف ناخن ها، رشد کوتیکول ناخن ها و

بثورات اریتماتوی برجسته در سطوح اکسترسور بندهای انگشتان و زانو به نفع کدام بیماری است؟

الف) Hereditary hemorrhagic telangiectasia (ب) CREST syndrome
ج) Dermatomyositis (د) Dermatitis herpetiformis

۸۶. بیماری تاکنون دو نوبت بدنبال تزریق بی حسی های مختلف دچار تنگی نفس، از دست رفتن

موقت هوشیاری، تورم لب و زبان و ضایعات پوستی شده است. در هر دو نوبت، علائم با تزریق اپی

نفرین بر طرف شده است. کدام روش برای جلوگیری از تکرار عوارض بی حسی توصیه می شود؟

الف) Cetirizine ۱۰ میلی گرم صبح روز درمان

ب) تزریق ۱۰۰ میلی گرم هیدروکورتیزون داخل وریدی قبل از تزریق بی حسی

ج) استفاده از محلول یک درصد دیفن هیدرامین بدون متیل پارابن به عنوان بی حسی

د) تجویز C1 Esterase Inhibitor قبل از تزریق بی حسی

۸۷. خانم ۳۲ ساله بعلت ضایعات لیکنویید گونه و کام سخت مراجعه می‌کند. در معاینه، Malar Rash توجه را جلب می‌کند. بر اساس طبقه بندی جدید، حضور کدام وضعیت قویا تشخیص لوپوس اریتماتوی سیستمیک مطرح می‌گردد؟

- الف) لکوپنی و آلپوسی در پوست سر
ب) لنفوپنی بارز و کاهش سطح CH50
ج) تست VDRL و Anti-nuclear antibody مثبت
د) ترومبوسیتوپنی و آنمی همولیتیک اتوایمیون

۸۸. خانم ۳۸ ساله از دو ماه پیش دچار درد دو طرفه مفصل فک و محدودیت در باز کردن شده است. کدام گزینه با تشخیص آرتریت روماتوئید مغایرت دارد؟

- الف) تورم متقارن مفاصل PIP همراه با گرمی و قرمزی و درد مفاصل
ب) منفی شدن تست های RF و Anti-CCP
ج) رفع سفتی صبحگاهی مفصل با فعالیت ظرف چند دقیقه
د) تغییرات اروزیو مارجینال در استخوان های مجاور مفاصل مبتلا

۸۹. تمام موارد در بیماری که دچار سفتی مفاصل دست و پدیده Raynaud شده است، به نفع تشخیص اسکلرودرمای منتشر می باشد، بجز :

- الف) آتروفی پره های بینی
ب) مثبت شدن Anti Centromere Ab
ج) زخم و Pitting Scar در نوک انگشتان دست
د) گشاد شدن منتشر فضای پریدونتال لیگامنت

۹۰. در تمام موارد می توان از پیوند مغز استخوان استفاده کرد، بجز :

- الف) لوسمی حاد میلوژنیک
ب) آنمی آپلاستیک
ج) تالاسمی ماژور
د) لوسمی لنفوسیتیک مزمن

۹۱. افزایش استعداد به ترومبوز در تمام موارد ممکن است رخ دهد، بجز:

- الف) پلی سایتمی ورا
ب) هموگلوبینوری حمله ای شبانه
ج) آنمی آپلاستیک
د) آنمی داسی شکل

۹۲. خانم ۵۸ ساله به علت خونریزی خودبخود از لثه مراجعه کرده است. در تاریخچه، خارش منتشر پوست پس از استحمام و در معاینه اسپلنومگالی مشاهده شده است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

- الف) آنمی آپلاستیک
ب) پلی سایتمی ورا
ج) ترومبوسایتوپنیک پورپورا
د) ترومبوتیک ترومبوسایتوپنیک پورپورا

۹۳. خانم ۶۵ ساله به علت ضایعه دهانی، آدنوپاتی گردن، تب و کاهش وزن از یک ماه قبل مراجعه می‌کند. در معاینه، ضایعه ای با پایه پهن و متمایل به خونریزی به رنگ ارغوانی در لثه خلفی بالا دیده می‌شود. دندان‌های مجاور ضایعه لق هستند. دو گره لنفاوی نسبتاً سفت، متحرک و بی درد نیز در زنجیره طرفی گردن در هر دو سمت لمس می‌شود. با توجه به نتیجه آزمایشات بیمار محتمل ترین تشخیص کدام است؟

WBC: 6.8×10^3

RBC : 4.8×10^6

Hct :41%

Hb: 13.9

MCV: 85

MCH:29

MCHC: 34

ESR : 65 1st/h

Smear : Normal

- (الف) لوسمی لنفوسیتیک حاد
(ب) لوسمی لنفوسیتیک مزمن
(ج) لنفوم هوچکین
(د) لنفوم نان هوچکین

۹۴. بیمار مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک که وارفارین مصرف می‌کند، جهت کشیدن دندان عقل مراجعه نموده است. نتایج آزمایشات شامل $INR=3$ و $Plt=40000/mm^3$ می‌باشد. رعایت همه موارد توصیه می‌شود، بجز :

- (الف) استفاده از ترانس آمیناز خوراکی
(ب) مشاوره پزشکی به جهت پلاکت پایین
(ج) استفاده از ترومبین موضعی
(د) ادامه وارفارین بدون تغییر دوز

۹۵. برای بیمار که به علت مصرف آنتی بیوتیک وسیع الطیف دچار کمبود ویتامین K شده است، این ویتامین بصورت تزریقی تجویز شده است. مکانیسم انعقاد چه مدت پس از تزریق، به وضعیت نرمال برمی‌گردد؟

- (الف) ۷ تا ۱۰ روز
(ب) ۳ تا ۴ روز
(ج) ۱۲ تا ۲۴ ساعت
(د) ۳ تا ۴ ساعت

۹۶. در صورت تشکیل هماتوم در محل تزریق بی حسی موضعی در مرد ۲۲ ساله ی مبتلابه هموفیلی، تجویز کدام مورد صحیح است؟

الف) استرپتولیزین موضعی ب) آنتی بیوتیک ج) ترانس آمین د) ترومبین موضعی

۹۷. تمام موارد در تشدید ضعف عضلانی در سالمندان دخالت دارند، بجز :

الف) مالتیپل اسکلروزیس ب) پارکینسون ج) آلزایمر د) سکته مغزی

۹۸. علت بیماری با کدام نوع مطالعه مشخص می شود؟

الف) Randomized Controlled trials ب) Cross sectional
ج) Case-Control د) Longitudinal Cohort

۹۹. ساخت پروتئین، محصول نهایی نسخه برداری از کدام قسمت Heterogenous RNA می باشد؟

الف) Junk ب) Intro ج) Exon د) Codon

۱۰۰. واکنش پریوستئال بصورت Hair on End در تمام موارد گزارش شده است، بجز :

الف) همانژیوما ب) متاستازهای استئوبلاستیک
ج) ضایعات ژانت سلی د) آنمی سلول داسی شکل