

مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ

بیماری های دهان فک و صورت برکت ۲۰۲۱

(جلد اول)

گردآوری و تألیف:

دکتر حسنا بهرامی

(استادیار بخش بیماری های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی کردستان)

دکتر مریم طهماسبی نسب

(دستیار تخصصی بخش بیماری های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران)

دکتر نگین علیاری

(دستیار تخصصی بخش بیماری های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران)

دکتر کیمیا حافظی مطلق

(دستیار تخصصی بخش بیماری های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران)

ویراستاران علمی:

دکتر حسنا بهرامی

دکتر مریم طهماسبی نسب

عنوان و نام پدیدآور	: مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ: بیماری‌های دهان فک و صورت - برکت ۲۰۲۱ گردآوری و تألیف حسنا بهرامی... [و دیگران].
مشخصات نشر	: تهران: شایان نمودار، ۱۴۰۳ -
مشخصات ظاهری	: ج: جدول.
شابک	: ج ۱: ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۳۷-۴-۴
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
یادداشت	: سوالات کتاب حاضر برگرفته از کتاب " Burket's oral medicine, 13th. ed, 2021 " به ویراستاری مایکل گلیک... [و دیگران] است.
یادداشت	: گردآوری و تألیف حسنا بهرامی، مریم طهماسبی نسب، نگین علیاری، کیمیا حافظی مطلق.
عنوان دیگر	: بیماری‌های دهان فک و صورت - برکت ۲۰۲۱.
عنوان دیگر	: بیماری‌های دهان برکت: تشخیص و درمان.
موضوع	: دهان -- بیماری‌ها -- آزمون‌ها و تمرین‌ها، Mouth -- Diseases -- Examinations, questions, etc. بیماری‌ها -- تظاهرات دهانی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها، Oral manifestations of general diseases -- Examinations, questions, etc دندان -- بیماری‌ها -- آزمون‌ها و تمرین‌ها، Teeth -- Diseases -- Examinations, questions, etc دندانپزشکی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها، Dentistry -- Examinations, questions, etc
شناسه افزوده	: بهرامی، حسنا، ۱۳۳۳
شناسه افزوده	: گلیک، مایکل
شناسه افزوده	: Glick, Michael
شناسه افزوده	: برکت، لیستر ویلیام، ۱۹۰۷ م - . بیماری‌های دهان برکت: تشخیص و درمان
رده بندی کنگره	: RCA۱۵
رده بندی دیویی	: ۶۱۷/۵۲۲۰۷۶
شماره کتابشناسی ملی	: ۹۷۴۳۲۷۵

نام کتاب: مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ بیماری‌های دهان، فک و صورت برکت ۲۰۲۱ (جلد اول)

گردآوری و تألیف: دکتر حسنا بهرامی، دکتر مریم طهماسبی نسب، دکتر نگین علیاری، دکتر کیمیا حافظی مطلق

ویراستاران علمی: دکتر حسنا بهرامی، دکتر مریم طهماسبی نسب

ناشر: انتشارات شایان نمودار

مدیر تولید: مهندس علی خزعلی

حروف چینی و صفحه آرایی: انتشارات شایان نمودار

طرح جلد: آتلیه طراحی شایان نمودار

نوبت چاپ: اول

شمارگان: ۵۰۰ جلد

تاریخ چاپ: تابستان ۱۴۰۳

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۳۷-۴-۴

قیمت: ۴۰۰،۰۰۰ ریال



شایان نمودار

دفتر مرکزی: تهران / میدان فاطمی / خیابان جهلستون / خیابان دوم / پلاک ۵۰ / بلوک B / طبقه همکف / تلفن: ۸۸۹۸۸۸۶۸



وب سایت: shayannemoodar.com



اینستاگرام: Shayan.nemoodar

(تمام حقوق برای ناشر محفوظ است. هیچ بخشی از این کتاب، بدون اجازه مکتوب ناشر، قابل تکثیر یا تولید مجدد به هیچ شکلی، از جمله چاپ،

فتوکپی، انتشار الکترونیکی، فیلم و صدا نیست. این اثر تحت پوشش قانون حمایت از مولفان و مصنفان ایران قرار دارد.)

مقدمه

فراموش می‌شوی
گویی که هرگز نبوده‌ای
مانند مرگ یک پرنده...
آزاد باش از فردایی که می‌خواهی!

خوانندگان محترم کتاب مجموعه سوالات برکت؛

این کتاب با هدف جمع آوری تعداد ۱۲۵۹ سوال و مجموعه سوالات آزمون‌های مورد، ارتقا و دست‌یاری سالهای ۱۳۹۰-۱۴۰۱ به تفکیک فصول و مطابق با برکت ۲۰۲۱ طراحی و تدوین شده است.

با توجه به تغییرات کتاب، صورت سوال یا گزینه‌های بعضی تست‌ها تغییر کرده و یا حذف شده‌اند.

همچنین سوالات تالیفی به منظور مرور نکات طراحی شده و حتما با بودجه بندی سوالات در آزمون‌های مورد و ارتقا مطابقت ندارد.

ضمناً از آنجایی که ما گروه نویسندگان، ۵ فصل منتخب آزمون رزیدنتی را تحت عنوان مرور با تست آوید گردآوری کرده‌ایم، در صورت تمایل به مرور تست‌های تالیفی بیشتر تهیه این کتاب خالی از لطف نیست.

پیشاپیش بابت نواقص موجود احتمالی عذرخواهی کرده و امید است که با ارائه این کتاب گامی در رسیدن به اهداف شما برداشته باشیم.

در پایان لازم میدانم، از مدیر محترم انتشارات شایان نمودار، جناب آقای مهندس خزعلی و همه همکاران ساعی و پرتلاششان قدردانی و تشکر نمایم.

با احترام

دکتر حسنا بهرامی

فهرست مندرجات

سوالات

پاسخنامه

۱۸۵	فصل اول
۱۸۹	فصل دوم
۱۹۳	فصل سوم
۲۱۵	فصل چهارم
۲۳۶	فصل پنجم
۲۵۰	فصل ششم
۲۶۹	فصل هفتم
۲۷۹	فصل هشتم
۲۸۷	فصل نهم
۳۰۶	فصل دهم

۵	فصل اول (سوال ۲۴)
۹	فصل دوم (سوال ۲۸)
۱۳	فصل سوم (سوال ۱۵۷)
۳۶	فصل چهارم (سوال ۱۳۴)
۵۶	فصل پنجم (سوال ۱۴۲)
۷۵	فصل ششم (سوال ۳۰۳)
۱۱۸	فصل هفتم (سوال ۸۷)
۱۳۱	فصل هشتم (سوال ۵۰)
۱۳۸	فصل نهم (سوال ۲۰۰)
۱۶۵	فصل دهم (سوال ۱۳۴)

فصل اول

۱- معمول ترین روش جهت کسب اطلاعات بیمار در مراکز دندانپزشکی کدام است؟

- (الف) پرسشنامه غربالگری اختصاصی
(ب) پرسش شفاهی
(ج) پرونده‌های قبلی
(د) مشاوره با پزشک

۲- در مرور **systematic** بدن (**Review of system**) کدام مورد زودتر از بقیه مورد توجه قرار می‌گیرد؟

- (الف) chest pain
(ب) headaches
(ج) skin cancer
(د) weight changes

۳- اطلاع در مورد واکسن های زده شده به بیمار در کدام مورد جای می‌گیرد؟

- (الف) chief complain
(ب) past medical history
(ج) review of system
(د) present illness history

۴- طبق مراحل معاینه در یک مطب دندانپزشکی کدام مورد دیرتر از بقیه بررسی می‌شود؟

- (الف) ثبت علائم حیاتی
(ب) معاینه مفصل گیجگاهی - فکی
(ج) ضایعات مخاط دهان
(د) معاینات اعصاب مغزی

۵- مشکلاتی از بیمار که مشخص شده‌اند ولی طی ارزیابی کنونی به درستی تشخیص داده نشده‌اند با کدام

توضیح در پرونده بیمار ذکر می‌شود؟

- (الف) by history
(ب) treated
(ج) to be ruled out
(د) previously diagnosed

۶- ارزیابی بیماران برای بروز عوارض جانبی با همه ی موارد زیر در ارتباط است به جز؟

- (الف) تداخلات دارویی
(ب) توانایی تحمل استرس
(ج) استعداد به عفونت
(د) همکاری بیمار حین درمان

۷- طبق دسته بندی MCS بیمار با آلرژی به پنی سیلین در کدام دسته قرار می گیرد؟

الف) MCS - ۲ A (ب) MCS - ۲ C (ج) MCS - ۱ C (د) MCS - ۱ B

۸- بیمار با آنزین غیر پایدار در کدام دسته از طبقه بندی MCS قرار می گیرد؟

الف) MCS - ۲ B (ب) MCS - ۳ (ج) MCS - ۱ C (د) MCS - ۲ C

۹- کدام گزینه در مورد معیار ASA صحیح نمی باشد؟

- الف) این معیار جهت ارزیابی توانایی بیمار در تحمل بی حسی عمومی استفاده می شود.
 ب) نباید برای پیش بینی مشکلات مرتبط با جراحی دندانان سرپایی به کار رود.
 ج) بیماری با یک بیماری سیستمیک شدید که تهدیدکننده حیات نیست در ASA IV قرار می گیرد.
 د) بیمار مبتلا به بیماری خفیف (mild) در ASA II قرار می گیرد.

۱۰- علائم بیماری (Symptoms) از چه طریقی شناخته می شود؟

- الف) معاینات پزشکی
 ب) آزمایشات لابراتواری
 ج) Review of system
 د) تصویربرداری تشخیصی

۱۱- همه ی ویژگی های زیر لازم است در سیستم های نمره دهی بیماری دهان ODSS (oral disease se- verity scoring) وجود داشته باشد به جز؟

الف) واقع گرایانه (ب) قابل تکرار (ج) مختصر و مفید (د) قابل اجرا

۱۲- کدام گزینه در مورد روش (POR) problem - oriented record صحیح نمی باشد؟

- الف) روی مشکلات با نیاز به درمان، بیشتر از تشخیص های رایج تمرکز می شود.
 ب) مشکلات می توانند subjective, objective یا از نظر بالینی مهم باشند.
 ج) به اهمیت جمع آوری صحیح و کامل داده های بالینی توجه می شود.
 د) ارتباط بین حرفه ای را تسهیل می کند اما پایه ای برای آموزش مشترک محسوب نمی شود.

۱۳- تصویربرداری ها در کدام یک از زیرمجموعه های SOAP جای می گیرند؟

الف) S (ب) O (ج) A (د) P

۱۴- تشخیص های افتراقی برای یک مشکل خاص در کدام یک از زیرمجموعه های SOAP جای می گیرد؟

الف) S (ب) O (ج) A (د) P

۱۵- کدام مورد از اتصالات چهارچوب SOAP می‌باشد؟

- الف) فقدان زمان
ب) اطلاعات ناقص
ج) کاربرد برای بیماران سرپایی
د) تمرکز روی شکایت اصلی

۱۶- استثناء در مورد اخذ رضایت آگاهانه کدام مورد است؟

- الف) بیوپسی جهت تشخیص قطعی لیکن پلان
ب) جراحی دندان عقل
ج) مدیریت شوک آنافیلاکسی
د) جراحی رادیکال SCC در ناحیه سر و گردن

آزمون

۱- در تکمیل ارزیابی ریسک انجمن بی‌هوشی آمریکا، فرد مبتلا به بیماری سیستمیک شدید با محدودیت فعالیت جزء کدام یک از تقسیم‌بندی‌های زیر قرار می‌گیرد؟ (بورد ۹۰)

- الف) P۱
ب) P۲
ج) P۳
د) P۴

۲- مثبت کاذب یک تست آزمایشگاهی با کدام یک از موارد زیر تعیین می‌شود؟ (ارتقا ۹۰)

- الف) specificity
ب) sensitivity
ج) accuracy
د) predictive value

۳- در کدام یک از مراحل بالینی تمرکز بر روی شکایت اصلی بیمار مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ (بورد ۹۰)

- الف) assessment
ب) objective
ج) subjective
د) plan

۴- Condition Diagram به عنوان استاندارد طبقه بندی تمام موارد زیر استفاده می‌شود به جز.....

(بورد ۹۱)

- الف) یافته های کلینیکی
ب) تشخیص های افتراقی
ج) روش های تشخیصی
د) عوامل اتیولوژیک

۵- اولین اصل در درمان بیماران (Primum non nocere) به چه معناست؟ (ارتقا ۹۱)

- الف) حفظ راز بیمار
ب) نزدن صدمه به بیمار
ج) گرفتن شکایت اصلی بیمار
د) بررسی سلامت بیمار

۶- ضعف پرسشنامه‌های از پیش تهیه شده برای کسب تاریخچه بیمار کدام مورد است؟ (ارتقا ۹۲)

الف) جمع آوری اطلاعات در مورد تاریخچه پزشکی بیمار

ب) جمع آوری اطلاعات در مورد تاریخچه دندانپزشکی بیمار

ج) جمع آوری اطلاعات در مورد present illness

د) ایجاد نقطه شروع برای مصاحبه شفاهی با بیمار

۷- جهت ارزیابی یک روش جدید آزمایشگاهی تشخیص دیابت، ۱۰۰ نفر غیردیابتی تحت آزمایش قرار

گرفتند نتیجه‌ی تست بدین صورت گزارش شده است: ۹۳ نفر سالم و ۷ نفر مبتلا به دیابت هستند در این

صورت کدام عبارت صحیح است؟ (بورد ۹۲)

الف) حساسیت تست ۹۳٪ بوده است.

ب) حساسیت تست ۷٪ بوده است.

ج) اختصاصی بودن تست ۹۳٪ بوده است.

د) اختصاصی بودن تست ۷٪ بوده است.

۸- تمام عوامل زیر در تغییر تنظیم پرونده بیمار دخیل می‌باشد به جز: (ارتقا ۹۳)

الف) قوانین خاص منطقه‌ای

ب) روش‌های متفاوت ارزیابی بیمار

ج) روش‌های تشخیصی گوناگون

د) نحوه تجویز روش درمانی

فصل دوم

۱- کدام موارد تحقیقات بالینی هستند که به صورت پژوهش‌های بیمار محور تعریف می‌شود؟

الف) مطالعه اپیدمیولوژیک روی افراد مبتلا به HPV

ب) مطالعه سیر طبیعی لیکن پلان

ج) روش‌های مورد استفاده در تشخیص TMD

د) همه موارد صحیح است.

۲- کدام گزینه نادرست است؟

الف) مداخله شامل هر چیزی است که بتواند سیر بیماری را تغییر دهد.

ب) مطالعات تحقیقات بالینی فضا به رضایت آگاهانه نیاز دارد.

ج) تحقیقات روی نمونه‌ی انسانی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن محقق به طور مستقیم با افراد تعامل دارد.

د) پژوهش‌های بیمار محور شامل تحقیقات بر روی خدمات سلامت نیز می‌باشد.

۳- کدام مورد محدودیت بارز (**obvious limitation**) در طراحی مطالعات **case series** است؟

الف) فقدان جمعیت افراد بدون بیماری (فقدان گروه کنترل)

ب) recall bias

ج) فقدان ارزش و اعتبار علمی

د) نیازمند موارد بسیار نادر بیماری

۴- کدام یک از انواع مطالعات اطلاعاتی فراهم می‌کند که یک تصویر لحظه ای "Snapshot" از وضعیت

تحت مطالعه است؟

الف) case report ب) case control ج) case – series د) clinical trial

۵- بررسی شیوع عفونت ناشی از پاپیلوما ویروس انسانی در زنان و مردان واکسینه نشده در سال ۲۰۰۹ تا

۲۰۱۶ نشان دهنده کدام نوع از مطالعات است؟

الف) case control ب) clinical trial ج) cross – sectional د) cohort

۶- یافته‌ها در مطالعات مورد شاهدهی معمولاً به صورت..... و در مطالعات cohort به صورت..... نشان داده می‌شوند.

- الف) relative risk – odd ratio
 ب) odd ratio – relative risk
 ج) odd ratio – odd ratio
 د) relative risk – relative risk

۷- تعیین نتایج استاندارد درمان مراقبتی از اهداف کدام یک از مطالعات زیر است؟

- الف) case – control
 ب) longitudinal cohort
 ج) cross – sectional
 د) case – series

۸- در مطالعات Cohort طولی کدام یک از خطاهای زیر ممکن است بر اثر عدم حفظ افراد تحت مطالعه در طی زمان رخ دهد؟

- الف) recall bias
 ب) attrition bias
 ج) selection bias
 د) information bias

۹- کدام یک از فازهای Clinical trial (کارآزمایی بالینی) با هدف تعیین آثار بالقوه و ایجاد یک پروفایل ایمن تر برای دارو انجام می‌شود؟

- الف) I
 ب) II
 ج) III
 د) IV

۱۰- حجم نمونه به کدام یک از موارد زیر بستگی دارد؟

- الف) تنوع داده‌ها
 ب) اندازه اثر
 ج) تفاوت بین مقادیر
 د) مکان جغرافیایی

۱۱- کدام نوع طراحی مطالعه فقط یک پیامد را می‌تواند مورد بررسی قرار دهد؟

- الف) cross-sectional
 ب) case-control
 ج) retrospective cohort
 د) clinical trial

۱۲- کدام نوع طراحی مطالعه قوی‌ترین شواهد برای causality بین یک فاکتور قابل تغییر و پیامد را فراهم می‌کند؟

- الف) case control
 ب) prospective cohort
 ج) cross – sectional
 د) clinical trial

۱۳- کدام مورد یک "serious adverse event" در نظر گرفته نمی‌شود؟

- الف) مرگ
 ب) آنومالی مادرزادی
 ج) بستری سرپایی
 د) واقعه تهدیدکننده حیات اورژانسی

۱۴- تعریف Sponsor کدام مورد است؟

- الف) فردی که مسئولیت شروع و مدیریت یک کارآزمایی بالینی را برعهده می گیرد.
 ب) یک کمپانی که فقط مسئولیت مالی یک کارآزمایی بالینی را می پذیرد.
 ج) یک کمپانی یا ساختار که مسئولیت مدیریت کیفیت را در برخی مراحل انجام کارآزمایی بالینی بر عهده دارد.
 د) هیچ کدام

۱۵- کدام مورد از نقاط قوت یک طراحی مطالعه cross sectional است؟

- الف) Good for rare disease
 ب) strongest evidence for causality
 ج) Time , resource efficient
 د) Can not assess multiple outcome

۱۶- ملاحظات قانونی برای مطالعات انسانی براساس چه چیزی تغییر می کند؟

- الف) safety reporting
 ب) time and resource
 ج) type of study
 د) Registration

۱۷- کدام نوع طراحی مطالعه ضعف "time and resource intensive" را دارد؟

- الف) clinical trial
 ب) case – control
 ج) retrospective cohort
 د) الف و ج

۱۸- کدام مطالعه پتانسیل recall bias را دارد؟

- الف) case control
 ب) cohort
 ج) cross – sectional
 د) clinical trial

۱۹- در کدام طراحی مطالعه exposure در گذشته اتفاق افتاده است؟

- الف) case control
 ب) cross sectional
 ج) prospective cohort
 د) clinical trial

آزمون

۱- کدام یک از انواع مطالعات برای بررسی incidence اختلالات مفصل گیجگاهی فکی و عوامل مرتبط با

آن در یک جامعه ایرانی مناسب تر است؟ (ارتقا ۹۵)

- الف) case control
 ب) longitudinal cohort
 ج) cross- sectional
 د) randomized control

۲- علت بیماری با کدام نوع مطالعه مشخص می شود؟ (بورد ۹۵)

- الف) randomized controlled trials (ب) cross – sectional
 ج) case – control (د) longitudinal cohort

۳- کدام نوع مطالعه از اعتبار کمتری نسبت به مابقی برخوردار است؟ (بورد ۹۶)

- الف) Cohort study (ب) Randomized Clinical Trial
 ج) Case – Control study (د) Systematics Review

۴- با انجام کدام یک از مراحل کارآزمایی بالینی می توان تأثیر بخشی (efficacy) یک ژل درمانی جدید در درمان زخم های آفتوس در دهان بیماران را مشخص نمود؟ (ارتقا ۹۷)

- الف) ۱ (ب) ۲ (ج) ۳ (د) ۴

۵- برای بررسی رابطه علت و معلولی در یک بیماری نادر بهترین طراحی پژوهش کدام است؟ (بورد ۹۷)

- الف) مقطعی (ب) مورد - شاهدهی (ج) کوهورت (د) کارآزمایی بالینی

۶- در کدام یک از فازهای مطالعات کارآزمایی بالینی، داروی جدید جهت تعیین اثرات بالقوه روی افراد تست می شود؟ (ارتقا ۹۸)

- الف) I (ب) II (ج) III (د) IV

۷- در کدام نوع از مطالعات، تغییر در شدت و بروز بیماری با مداخله سنجیده می شود؟ (بورد ۹۸)

- الف) Systematic Review (ب) Randomized Clinical Trial
 ج) Longitudinal Cohort (د) Case – Control study

۸- اثربخشی استفاده از داروی Remdesivir در افراد مبتلا به کووید -۱۹ به طور تصادفی برای درمان های متفاوت انتخاب شده اند. در کدام فاز کارآزمایی بالینی سنجیده می شود؟ (بورد ۹۹)

- الف) I (ب) II (ج) III (د) IV

۹- انجام کدام مطالعه به منظور دریافت مجوز ساخت دارو از شرکت ها صورت می گیرد؟ (بورد ۱۴۰۰)

- الف) Cohort (ب) case – control
 ج) pivotal (د) cross – sectional

فصل سوم

۱- کدام واژه برای تعریف "ضایعات با حدود مشخص و مسطح که تنها تفاوت آنها با مخاط اطراف تغییر رنگ می‌باشد" صحیح است؟

الف) پلاک ب) ندول ج) ماکول د) اروژن

۲- کدام واژه‌ی توصیفی ضایعه از نظر سایز می‌تواند با بقیه متفاوت باشد؟

الف) وزیکول ب) اکیموز ج) پاپول د) بول

۳- احتمال بروز کدام شرایط با ۲ و HSV امکان‌پذیر است؟

الف) herpes withlow ب) هرپس گلادیاتوروم
ج) ازوفاژیت د) عفونت نئوناتال

۴- کدام گزینه در رابطه با ژنژیواستوماتیت هرپتیک صحیح است؟

الف) بیشتر عفونت‌های اولیه دارای علائم بالینی بوده و اغلب در کودکان و نوجوانان رخ می‌دهد
ب) در تمام بیماران، خودمحدود شونده بوده و طی ۱۴-۱۰ روز بهبود می‌یابد.
ج) انواع اولیه و ثانویه در مخاط کراتینیزه و غیرکراتینیزه بروز می‌یابد و از این جهت با آفت قابل افتراق است.
د) در Shedding بدون علامت، ویروس بدون علائم سیستمیک و علائم بالینی منتشر می‌شود.

۵- کدام گزینه در رابطه با تست‌های تشخیصی در عفونت HSV صحیح می‌باشد؟

الف) حساسیت و اختصاصیت کشت از Diff و IIF بیشتر است.
ب) مقدار ویروس HSV تا هفته‌ها بعد از بهبودی افت پیدا نمی‌کند به همین دلیل کشت، استاندارد طلایی تشخیص است.
ج) PCR ریزش بدون علامت ویروس در بزاق را هم نشان می‌دهد.
د) مزیت کشت به روش Centrifugation – enhanced (shell vial) نسبت به کشت به روش معمول، امکان تعیین ساب تایپ ویروس می‌باشد.

۶- در کدام عفونت در بیوپسی، هسته‌ها به صورت ground glass (شیشه مات) مشاهده می‌شود؟
 الف) HSV ب) CMV ج) EBV د) CV

۷- کدام عفونت هرپسی به صورت عودکننده در افراد با ایمنی تضعیف شده به صورت سرکوب مغز استخوان بروز می‌کند؟

الف) HHV۶ ب) HHV۷ ج) HHV۴ د) HHV۵

۸- ژنژیواستوماتیت در تمام موارد زیر اتفاق می‌افتد به جز؟

الف) عفونت اولیه HH۱ ب) عفونت عودکننده HHV۱

ج) عفونت اولیه HHV۲ د) عفونت عودکننده HHV۲

۹- در صورت درگیری شاخ قدامی نخاع در بیماران مبتلا به VZV کدام عارضه با احتمال کمتری روی می‌دهد؟

الف) هیپاتیت ب) رتینیت ج) انسفالیت د) میلیت

۱۰- کدام گزینه در رابطه با عفونت VZV صحیح است؟

الف) نورالژی پس از هرپس با شروع راش‌های حاد پوستی و تا ۱۲۰ روز بعد از آن ادامه دارد

ب) تب بالا و لنفادنوپاتی در اغلب بیماران زونا مشاهده می‌شود.

ج) نورالژی پس از هرپس به صورت درگیری اعصاب محیطی و مرکزی و تغییر در پردازش سیستم اعصاب مرکزی می‌باشد.

د) ضایعات زونا اغلب با جایگذاری اسکار و هیپرپیگمانتاسیون همراه است.

۱۱- احتمال همراهی تمام بیماری‌های زیر با عفونت CMV در مبتلایان به ایدز وجود دارد به جز؟

الف) انسفالیت ب) گیلن باره سندرم

ج) پلی رادیکولوپاتی د) سندرم Ramsay hunt

۱۲- شایعترین یافته اختصاصی در عفونت CMV کدام است؟

الف) گاستروانتریت ب) پنومونی ج) هپاتیت د) رتینیت

۱۳- کدام گزینه در رابطه با CMV غلط است؟

الف) در دهان اغلب به صورت زخم نکروتیک منفرد و در موارد غیرشایع به صورت زخم‌های متعدد بروز می‌کند.

ب) در پوست بدون ضایعه هم مشاهده می‌شود

ج) سرایت ویروس از طریق مسیر تنفسی یا گوارشی است
 د) ۷-۶٪ بیماران علائم مشابه مونونوکلئوز عفونی را بروز می‌دهند.

۱۴- کدام عبارت در رابطه با عفونت کوکساکسی ویروس صحیح است؟

الف) همانند سازی ویروس ابتدا در دهان و سپس در قسمت تحتانی مجرای گوارش و با شیوع کمتر اوروفارنکس اتفاق می‌افتد
 ب) انتقال عمدتاً از طریق مسیر تنفسی فوقانی و در برخی موارد از طریق دهانی - مقعدی اتفاق می‌افتد.
 ج) گلودرد تنها در هرپانژین از بین انواع عفونت‌های کوکسی ویروس‌ها اتفاق می‌افتد.
 د) تب درجه بالا در انواع HFM و هرپانژین در عفونت‌های کوکسی ویروس‌ها اتفاق می‌افتد.

۱۵- کدام یک از ویروس‌های زیر در رابطه با HFM و هرپانژین می‌باشد؟

الف) CVA_{۱۵، ۱۵} و CVA_{۷۱، ۳۶} (ب) CV_{A۱۰} و CVA_{۲۲}
 ج) CVA_{۱۶، ۷۱} و CVA_{۲۲، ۱-۱۰} (د) CA_{۱۶، ۷۱} و CVA_{۲۲}

۱۶- تظاهر بالینی کدام یک با بقیه می‌تواند متفاوت باشد؟

الف) فارنژیت لنفوندولار (ب) هرپانژین
 ج) HFM (د) ژنژیواستوماتیت هرپتیک اولیه

۱۷- در کدام عفونت ویروسی، درمان ضدویروس موثری وجود ندارد؟

الف) CMV (ب) EBV (ج) CV (د) VZV

۱۸- الگو و شدت تب در تمام گزینه‌ها غلط است به جز؟

الف) HFM: تب درجه بالا (ب) هرپانژین: تب درجه پایین
 ج) نوما: تب Fluctuant (د) زونا: تب درجه بالا

۱۹- کدام میکروارگانسیم ویژه NUP در بیماران مبتلا به ایدز می‌باشد؟

الف) پیتواسترپتوکوک (ب) کاندیدا (ج) فوزوباکتریوم نوکلئاتوم (د) تریپونما

۲۰- نقص در کنترل عفونت در مبتلایان NUG کدام علت است؟

الف) تولید اندوتوکسین
 ب) هرپس ویروس‌ها در شیار لثه
 ج) کاهش قدرت کموتاکسی نوتروفیل و فاگوسیت
 د) تمام موارد

۲۱- کدام میکروارگانیزم در عفونت NUG منجر به تحریک رشد پروتلا اینترمدیا می شود؟

- الف) فوزوباکتریوم نکروفوروم
ب) تریپونما
ج) پپتواسترپتوکوک
د) کمپیلوباکتر

۲۲- شایع ترین محل داخل دهانی درگیر در EM کدام است؟

- الف) مخاط باکال
ب) لب
ج) مخاط لبیال
د) زبان

۲۳- درگیری کدام ارگان بدن در سندروم بهجت می تواند تهدیدکننده حیات باشد؟

- الف) CNS
ب) قلب
ج) عروق بزرگ
د) کلیه

۲۴- در تمام شرایط زیر در سندرم بهجت جهت درمان نیازمند درمان تهاجمی است به جز:

- الف) uveitis
ب) درگیری CNS
ج) درگیری گوارشی
د) درگیری مخاط دهان

۲۵- کدام روش درمانی در ضایعات آفت به ترتیب بروز و تعداد ضایعات را کاهش می دهد؟

- الف) تالیدومید - کلشی سین
ب) بتامتازون - داپسون
ج) داپسون - تالیدومید
د) بتامتازون - تالید و مید

۲۶- درمان پمفیگوس به تمام موارد زیر بستگی دارد به جز:

- الف) شدت بیماری
ب) فعالیت بیماری
ج) بیماری های همراه
د) مکان

۲۷- داروهای ضد دیابت مثل گلیپیتین ممکن است با شروع کدام ضایعات پوستی - مخاطی همراه باشد؟

- الف) PV
ب) LAD
ج) MMP
د) BP

آزمون

۱- کدام گزینه در مورد شکل زخم های پمفیگوس صحیح است؟ (دستیاری ۱۴۰۲)

- الف) تاول با دیواره ضخیم
ب) گسترش عمقی
ج) در زمینه مخاط غیرملتهب
د) الگوی متقارن

۲- کدام گزینه در شناسایی زخم های دهانی اهمیت کمتری دارد؟ (دستیاری ۱۴۰۲)

- الف) مکان
ب) تعداد
ج) سیر بالینی
د) اندازه

۳- در بیماری که از ۲ ماه پیش دچار زخم منفرد دردناک بزرگی در کناره‌ی زبان شده است کدام عفونت ویروسی می‌تواند موجب بروز آن باشد؟ (دستیاری ۱۴۰۲)

الف) CMV ب) EBV ج) HHV۸ د) HHV۷

۴- بیمار آقای ۲۵ ساله با ضایعات و زخم‌های منتشر و متعدد از ۲ روز قبل مراجعه نموده است تمام موارد می‌تواند موجب بروز ضایعات باشد، به جز: (ارتقا ۱۴۰۲)

الف) استوماتیت قارچی ب) استوماتیت باکتریایی
ج) استوماتیت ویروسی د) واکنش آلرژیک

۵- عفونت کوکساکسی ویروس در بیماری (دست - پا - دهان) به کدام صورت شروع می‌شود؟ (ارتقا ۱۴۰۲)

الف) Erythematous macules ب) Papular rash
ج) irritable skin eruption د) painful swelling

۶- خانم ۸۲ ساله که یک ماه قبل به زونا مبتلا شده، دچار درد تیرکشنده در محل ابتدا گشته است. تجویز کدام دارو جهت درمان ارجح می‌باشد؟ (ارتقا ۱۴۰۲)

الف) والاسیکلوویر ب) پردینزون ج) آمی‌تریپتیلین د) گاباپنتین

۷- در بیماری که دچار اریتم مالتی فرم عود کننده دهانی فاقد علائم پوستی است ضایعات دهانی در افتراق با کدام است؟ (ارتقا ۱۴۰۲)

الف) primary HSV Gingiostomal ب) necrotizing ulcerative gingivitis
ج) cytomegalovirus infection د) Recurrent Aphthous ulcers

۸- خانم ۳۵ ساله با شکایت از درد و خونریزی لثه حین مسواک زدن مراجعه کرده است. در معاینه بالینی لثه مارژینال و چسبنده ملتهب و ادماتوز می‌باشد. همچنین بیمار از دیسفاژی و گرفتگی صدا شکایت دارد همه موارد در ایجاد علائم دخالت دارند به جز: (ارتقا ۱۴۰۲)

الف) ترکیبات خمیردندان ب) تمیزکننده‌های خانگی
ج) مصرف دخانیات د) آبنبات‌های نعنائی

۹- قطع دارو موجب بهبود علائم بالینی پمفیگوس دارویی می‌شود؟ (ارتقا ۱۴۰۲)

الف) L -dopa ب) Captopril ج) NSAID د) clonidine

۱۰- کدام دارو به عنوان خط اول درمان پمفیگوس متوسط و شدید می باشد که توسط FDA تایید شده است؟ (ارتقا ۱۴۰۲)

الف) پردنیزولون (ب) ریتوکسیماب (ج) مایکوفنولات مفتیل (د) تاکرولیموس

۱۱- عفونت هرپسی راجعه دهانی (RIH) منفرد در صورت بروز مخاط غیرکراتینیزه با کدام یک از موارد زیر بیش از همه در تشخیص افتراقی قرار می گیرد؟ (ارتقا ۹۱)

الف) NUG (ب) زخم آفتی (ج) عفونت CMV (د) زخم های ناشی از نوتروپنی

۱۲- HHV۶ منجر به همه ی بیماری های زیر می شود به جز: (پره بورد ۹۱)

الف) Roseola infection (ب) اوتیت مدیا (ج) انسفالیت (د) تب های گرانتوماتوز

۱۳- کودک ۱۱ ساله از ۳ روز پیش دچار گلو درد، احساس کسالت، تب، آدنوپاتی گردن و اسپلنومگالی خفیف شده است. در معاینه چند پتشی در کام و دو زخم آفتی کوچک در مخاط لب و زبان دیده می شود تمام ویروس ها به عنوان علت بیماری مطرح می شود به جز: (بورد ۹۵)

الف) EBV (ب) HHV-۶ (ج) CMV (د) HHV۸

۱۴- استاندارد طلایی جهت تشخیص عفونت ویروس هرپس سیمپلکس چیست؟ (دستیاری ۹۰ و ارتقا ۹۰)

الف) کشت سلولی (ب) ایمونوفلورسنت مستقیم (ج) رنگ آمیزی گیمسا (د) شناسایی آنتی بادی

۱۵- بیمار مبتلا به لوسمی حاد، دچار زخم مزمنی در گوشه دهان شده است در معاینه زخمی بزرگ با حاشیه اسکالوپ دیده می شود ک در اطراف آن چند زخم اقماری وجود دارد. در نمونه انسیژنال حاشیه ی زخم دژنرسانس بالونینگ انکولوزین ها داخل هسته ای و سلول های ژانت چند هسته ای گزارش شده است. کدام روش تشخیص از روش های کمتری برخوردار است؟ (بورد ۹۵)

الف) کشت (ب) Real - time PCR (ج) برداشت نمونه با سواپ و رنگ آمیزی Gimsa (د) اسمیر سیتولوژی با رنگ آمیزی فلورسنت

۱۶- همه ویروسهای زیر علائم مونونکئوز عفونی یا شبیه آن را ایجاد می کنند به جز: (دستیاری ۹۷)

الف) HHV۶ (ب) HHV۴ (ج) HHV۵ (د) HHV۸

۱۷- زخم‌های Recudescent در روی کام بیمار immunocompetent شبیه کدام مورد است؟ (پره بورد ۹۳)

- الف) نکروتائیزینگ سیالومتاپلازی
 ب) پلاسماسل استوماتیت
 ج) سوختگی ناشی از غذا
 د) اتوزینوفیلیگ گرانولوما

۱۸- zoster sine eruption به کدام یک از موارد زیر اطلاق می‌شود؟ (دستیاری ۹۱)

- الف) اسکار ناشی از ضایعات هرپس زوستر
 ب) زونای بدون تظاهرات درماتوم
 ج) نورالژی post-herpetic
 د) زونای با درگیری دو طرفه پوستی

۱۹- کدام ضایعه ویروسی در مبتلایان به عفونت HIV موجب از دست دادن دندان می‌شود؟ (ارتقا ۹۶)

- الف) زونا
 ب) کندیلوما آکومیناتوم
 ج) کاپوسی سارکوم
 د) منونوکئوز عفونی

۲۰- در افتراق هرپس عودکننده از زونا تمام موارد زیر صحیح است به جز: (بورد ۸۸)

- الف) فقدان درگیری لثه در زونا برخلاف هرپس عودکننده
 ب) نبود تاریخچه عود در زونا برخلاف هرپس عودکننده
 ج) گستردگی بیشتر ضایعات زونا نسبت به هرپس عودکننده
 د) امکان نکروز پالپی و تحلیل ریشه در زونا برخلاف هرپس عودکننده

۲۱- اولین خط درمانی برای Post-herpetic neuralgia کدام است؟ (بورد ۹۳)

- الف) کاربامازپین
 ب) باکلوفن
 ج) گاباپنتین
 د) فنی توئین

۲۲- تست تشخیصی جهت عفونت فعال CMV کدام است؟ (پره بورد ۹۳)

- الف) کشت بافت
 ب) تیتراسیون CMV-ab
 ج) بیوپسی
 د) DNA hybrid

۲۳- تهیه smear اقدام تشخیصی همه ضایعات دهانی زیر می‌تواند باشد به جز: (بورد ۹۰)

- الف) بلاستوماپیکوز
 ب) عفونت راجعه هرپس
 ج) عفونت سایتومگال
 د) کاندیدیاژیس

۲۴- یک فرد مبتلا به ایدز به علت زخم crater-like دردناکی در کام سخت که در اطراف آن چند زخم

اقماری دیده می‌شود با سیر دو ماهه مراجعه کرده است ضایعه مشابهی در سطوح دورسال زبان نیز وجود

دارد. بهترین درمان کدام است؟ (بورد ۹۶)

- الف) آمفوتریسین B
 ب) آسیکلوویر
 ج) فلوکونازول
 د) تریامسینولون

۲۵- راه اصلی انتقال ویروس کوکساکسی کدام است؟ (دستیاری ۹۶)

الف) استنشاقی ب) تماس پوستی ج) فراورده های خونی د) دهانی - مدفوعی

۲۶- ویروس های کوکساکسی در تمام نواحی تکثیر و منتشر می شوند به جز: (ارتقا ۹۵)

الف) حفره دهان ب) مجرای گوارشی تحتانی

ج) دستگاه تنفسی فوقانی د) غده های لنفاوی

۲۷- کدام جمله با مشخصات بیماری **Hand foot and mouth** مطابقت دارد؟ (بور ۹۳)

الف) شایعترین پاتوژن آن ۱۰ CVA است ب) درگیری CNS با نوع ویروس در ارتباط است

ج) ضایعه دهانی پیشتر لثه را مبتلا می کند د) ضایعات پوستی به صورت پاپولو پوستولار می باشد.

۲۸- در یک مهدکودک، ۸ نفر در یک کلاس از ۴ روز پیش دچار علائمی نظیر تب، سردرد، بی حالی،

بی اشتها و گلودرد شده اند. تنها یافته بالینی وجود وزیکول ها و زخم هایی در کام نرم و سخت و دیواره

خلفی لوزه ها می باشد. بهترین تشخیص کدام است؟ (دستیاری ۹۷)

الف) عفونت تبخال اولیه ب) دست، پا، دهان

ج) هرپانژین د) فارنژیت لنفوندولر حاد

۲۹- در بیمار مبتلا به ایدز با زخم منفرد نکروتیک در ناحیه دهان که مدت ۲ هفته از ایجاد آن می گذرد همه

موارد زیر در تشخیص افتراقی قرار می گیرد به جز: (ارتقا ۹۱)

الف) عفونت CMV ب) aphtous ulcer

ج) NUP د) Herpangin

۳۰- پمفیگوس پارانئوپلاستیک در موارد شدید مشابه کدام بیماری است؟ (دستیاری ۹۴)

الف) درماتیت هرپسی فرم ب) اپیدرمولیز بلوزا

ج) پمفیگوئید غشا مخاطی د) توکسیک اپیدرمال نکرولیز

۳۱- تشخیص کدام یک از ضایعات زیر صرفاً براساس یافته های بالینی بوده و تست های لابراتواری هیچ

کمکی در این رابطه نمی کند؟ (دستیاری ۹۵)

الف) هرپس حاد اولیه ب) زونا

ج) اریتم مالتی فرم د) پمفیگوس ولگاریس

۳۲- احتمال بروز سندرم استیون - جانسون به دنبال کدام یک از موارد زیر کمتر است؟ (پربورد ۹۲)

- الف) عفونت HSV
ب) آلوپریونول
ج) NSAID
د) مصرف داروهای ضد تشنج

۳۳- در اریتم مولتی فرم عودکننده غیرمرتبط با HSV کدام دارو تجویز می‌شود؟ (پربورد ۹۳)

- الف) آسیکلوویر
ب) والاسیکلوویر
ج) داپسون
د) آزاتیوپرین

۳۴- مهمترین علامت افتراقی اریتم مالتی فرم از هرپس اولیه کدام است؟ (دستیاری ۹۲)

- الف) تب
ب) درگیری لثه
ج) شروع ناگهانی
د) زخم‌های دهانی

۳۵- آقای ۵۰ ساله پس از ۴ روز درد و سوزش در نیمه چپ زبان دچار زخم‌های کوچک گرد با اتیولوژی

خوشه‌ای شده است سایر مخاطات دهان سالم است محتمل‌ترین تشخیص افتراقی کدام است؟ (ارتقا ۹۱)

- الف) اریتم مالتی فرم
ب) هرپس زوستر
ج) پارانتیوپلاستیک پمفیگوس
د) NUG

۳۶- خانمی ۲۰ ساله با شکایت از زخم‌های دهانی منتشر دردناک از ۳ روز پیش به کلینیک بیماری‌های

دهان مراجعه نموده است نواحی درگیر مخاط گونه، زبان و لبیال است. بر روی لب‌ها نیز دلمه خونی مشاهده

می‌شود اولین تشخیص افتراقی چیست؟ (ارتقا ۹۱)

- الف) پمفیگوئید مخاطی
ب) پمفیگوس ولگاریس
ج) ژنژیواستوماتیت هرپتیک اولیه
د) اریتم مالتی فرم

۳۷- کدام عبارت در مورد نمای بالینی زخم آفتی مینور صحیح است؟ (دستیاری ۹۰)

- الف) در ابتدا به صورت پلاک سفید ظاهر می‌شود
ب) به صورت زخم گرد و عمیق می‌باشد
ج) فاقد آویخته بافتی است
د) شایع‌ترین ناحیه درگیر کام است

۳۸- براساس تحقیقات اخیر کدام اختلال ایمونولوژیک، عامل احتمالی ایجاد زخم مخاطی در آفت می‌باشد؟

(بورد ۹۶)

- الف) کمپلکس آنتی ژن - آنتی بادی
ب) تغییر در تعداد عملکرد سیستم مونوسیت - ماکروفاژ
ج) افزایش در پاسخ ایمنی با واسطه سلولی
د) حضور گسترده لنفوسیت‌های غیرطبیعی در خون محیطی

۳۹- اریتم مولتی فرم عودکننده در غیاب یافته‌های پوستی با کدام ضایعه اشتباه می‌شود؟ (ارتقا ۹۷)

- الف) عفونت هرپس عودکننده
ب) پریدونتیت نکروزان حاد
ج) آفت عودکننده
د) پمفیگوئید غشا مخاطی

۴۰- خانمی ۶۵ ساله با ضایعات تاولی - زخمی در زمینه التهابی در مخاط گونه که از ۵ ماه پیش شروع شده مراجعه کرده است همچنین ضایعات پاپولر خارش دار در زیر بغل و بازوها مشاهده می شود. مناسب ترین تشخیص بالینی کدام است؟ (دستیاری ۹۴)

- الف) لیکن پلان اروزو
ب) پمفیگوئید بلوز
ج) پمفیگوس ولگاریس
د) پمفیگوئید غشا مخاطی

۴۱- پمفیگوس پارائو پلاستیک در موارد شدید مشابه کدام بیماری است؟ (دستیاری ۹۴)

- الف) درماتیت هرپستی فرم
ب) اپیدرمولیز بلوزا
ج) پمفیگوئید غشای مخاطی
د) ترکیب اپیدرمال نکرولیز

۴۲- در تشخیص افتراقی بیمار مبتلا به ژنژیویت دسکواماتیو کدام بیماری قرار می گیرد؟ (دستیاری ۹۵)

- الف) پمفیگوس ولگاریس
ب) موکوزیت ناشی از شیمی درمانی
ج) اپیدرمولیز بلوز
د) هرپس اولیه

۴۳- روش آزمایشگاهی مناسب جهت پیگیری پیشرفت بیماری در بیمار مبتلا به پمفیگوس ولگاریس تحت درمان چیست؟ (دستیاری ۹۰)

- الف) اندازه گیری تیترا آنتی بادی در خون
ب) ایمونوفلورسنت مستقیم
ج) ایمونوفلورسنت غیرمستقیم
د) نمونه برداری از ضایعات جدید

۴۴- شایع ترین محل درگیری در پمفیگوئید خوش خیم مخاطی بعد از مخاط دهان کدام است؟ (دستیاری ۹۳)

- الف) ملتحمه چشم
ب) پوست
ج) دستگاه ژنیتال
د) نازوفارنکس

۴۵- مرد ۵۳ ساله از ۲ ماه پیش دچار ضایعات بولوز گسترده شده است ضایعات از مخاط دهان شروع شده اند و پس از ۳ روز به پوست گسترش یافته اند. در حال حاضر بیمار دچار تنگی تنفس، سرفه دردناک و قرمزی چشمها نیز شده است. III نشانگر آنتی بادی علیه ایپی تلیوم قلب و کلیه می باشد با شروع درمان کدام قسمت پاسخ بهتری نشان خواهد داد؟ (بورد ۹۵)

- الف) پوست
ب) مخاط دهان
ج) دستگاه تنفسی
د) چشم

۴۶- مردی ۶۰ ساله تحت درمان با Levodopa دچار سوزش (قرمزی لثه و مخاط لبها شده است)

محتمل ترین تشخیص کدام است؟ (ارتقا ۹۶)

- الف) پمفیگوئید بلوز
ب) بیماری IgA خطی
ج) پمفیگوس فولیاسه
د) پمفیگوس ولگاریس

۴۷- عمده‌ترین تفاوت بیماری پمفیگوس و استیون جانسون: (پره بورد ۹۲)

- الف) درگیری پوست و مخاط
 ب) واکنش به دارو
 ج) سیر بیماری
 د) نحوه کنترل بیماری

۴۸- شایع‌ترین درماتوز زیر اپی‌تلیالی تاوولی کدام است؟ (پره بورد ۹۲)

- الف) سیکاتریال پمفیگوئید
 ب) بولوز پمفیگوئید
 ج) بیماری IgA خفی
 د) بیماری بولوز مزمن دوران کودکی

۴۹- کدام عضو در پمفیگوس پارائئوپلاستیک به درمان پردنیزولون به همراه سرکوب‌گر ایمنی پاسخ بهتری می‌دهد؟ (بورد ۹۳)

- الف) پوست
 ب) مخاط دهان
 ج) ملتحمه
 د) ریه

۵۰- خانمی ۴۰ ساله با شکایت از قرمزی لثه مارژینال و چسبنده در قسمت باکال دندان‌های قدامی مراجعه نموده است. در بررسی ایمونوفلوروسنت ضایعه، رسوب IgG و کمپلمان در ناحیه‌ی لابه‌ی بازال گزارش شده است. اولین اقدام درمانی شما کدام است؟ (دستیاری ۹۷)

- الف) درمان علامتی و پیگیری بیمار
 ب) تجویز کورتیکواستروئید موضعی
 ج) تجویز داپسون به صورت سیستمیک
 د) دهانشویه تتراسایکلین

۵۱- در صورت عدم پاسخ LAD به استروئید موضعی کدام دارو به رژیم درمانی اضافه می‌شود؟ (بورد ۹۰)

- الف) داپسون
 ب) میکوفنولات مفتیل
 ج) تاکرولیموس
 د) رتینوئید خوراکی

۵۲- کدام گزینه در مورد پمفیگوس پارائئوپلاستیک صحیح است؟ (بورد ۹۰)

- الف) شروع بیماری تدریجی است
 ب) تظاهرات دهانی به شکل ضایعات نکروتیک است
 ج) در صورت همراهی با سندرم Castleman پیش آگهی بدی دارد.
 د) ایمونوفلوروسنت غیرمستقیم منفی است.

۵۳- بیمار ۶۵ ساله به علت آریتمی قلبی تحت درمان با آمیودارون قرار گرفته است پس از مدتی وی با ضایعات تاوولی و ژنژیویت دسکوماتیو مراجعه می‌کند در بیوپسی، تاوول حاوی نوتروفیل مشاهده می‌شود.

IF وی نیز منفی گزارش شده است. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟ (بورد ۹۵)

- الف) پمفیگوس ولگاریس
 ب) پمفیگوئید غشا مخاطی
 ج) بیماری IgA خفی
 د) استوماتیت ناشی از دارو

۶۰- مردی ۵۴ ساله دچار زخمی بدون درد با سیر دوماهه به قطر ۱ cm شده است. مرکز زخم فرو رفته و حاشیه‌ی آن اریتماتوز و در برخی نواحی کراتوتیک است. عامل ترومای موضعی وجود ندارد و گروه‌های لنفاوی تحت فکی قابل لمس و دردناک هستند. بیمار از نظر عمومی سالم می‌باشد. در نمای بافت شناسی، زخم التهاب مزمن همراه با اینفیلتراسیون ائوزینوفیل و سلول‌هایی شبیه هیستوسیت، لابه لای عضلات گزارش شده است کدام اقدام برای بیماران مناسب‌تر است؟ (بورد ۹۶)

الف) تزریق هفتگی استروئید داخل ضایعه تا زمان التیام

ب) درخواست رنگ‌آمیزی نمونه به روش زیل - نلسون و PAS

ج) درخواست رنگ‌آمیزی از نظر وجود پروتئین S۱۰۰

د) تکرار نمونه برداری با عمق بیشتر

۶۱- تجویز پماد کلوبتازول در درمان آفت می‌تواند موجب کاهش بروز تمام موارد گردد به جز: (بورد ۱۴۰۰)

الف) تعداد زخم ب) زمان التیام ج) اندازه زخم د) شدت ضایعه

۶۲- التهاب معده‌ای - روده‌ای از عوارض ابتلا به کدام ویروس می‌باشد؟ (ارتقا ۱۴۰۱)

الف) HHV۱ ب) HHV۲ ج) HHV۴ د) HHV۶

۶۳- فلج بل بیشتر توسط کدام ویروس ایجاد می‌شود؟ (ارتقا ۱۴۰۱)

الف) HSV ب) VZV ج) CMV د) HMV۶

۶۴- آقای ۳۲ ساله با شکایت از زخم دردناک بزرگ از ۲ هفته قبل مراجعه نموده است ایشان سابقه‌ی زخم‌های عودکننده کوچک و متعدد قبلی را ذکر می‌کند. در معاینه یک زخم فرو رفته با حاشیه‌ی مختصر برجسته و اریتماتوز به اندازه ۲ cm در کام نرم مشاهده می‌شود. تمام داروهای سیستمیک زیر در درمان ایشان موثر است به جز: (ارتقا ۱۴۰۱)

الف) داپسون ب) پنتوکسی فیلین ج) داکسی سایکلین د) تالیدومید

۶۵- در خانم ۴۰ ساله با زخم‌های منتشر دهانی دردناک پیشرونده از ۳ ماه قبل که هم اکنون وزیکول کوچک در پوست تنه هم ایجاد شده است استاندارد طلایی تشخیص بیمار کدام است؟ (ارتقا ۱۴۰۱)

الف) Real time PCR ب) Diff

ج) بیوپسی د) ایمونوبلاستیک با اپیدرم

۶۶- جهت کاهش استفاده از دوز کورتیکواستروئید در درجات متوسط بیماری پمفیگوئید بولوز از کلیه داروهای زیر استفاده می شود به جز: (ارتقا ۱۴۰۱)

- الف) تتراسایکلین
ب) مینوسیلکین به همراه نیستاتین آمید
ج) میکوفنولات مفیتیل
د) داپسون

۶۷- آقای ۴۵ ساله به دلیل زخم های عودکننده، گرد - قرینه و دردناک بر روی لثه ی چسبنده از ۳ روز قبل مراجعه نموده است مناسب ترین اقدام چیست؟ (بورد ۱۴۰۱)

- الف) تجویز کورتیکواستروئید
ب) آزمایشات هماتولوژیک
ج) مکمل های خوراکی
د) نمونه برداری

۶۸- خانم ۴۵ ساله مبتلا به دیابت با شکایت از خونریزی لثه و بوی بد دهان که به تازگی شروع شده مراجعه نموده است لنفادنوپاتی ساب مندیبولار وجود دارد و لثه ها قرمز و دردناک هستند محتمل ترین تشخیص کدام است؟ (بورد ۱۴۰۱)

- الف) Necrotizing ulcerative gingivitis
ب) primary Herpes gingivostomatitis
ج) erythema multiforme
د) plasma cell gingivitis

۶۹- پسر بچه ۱۰ ساله با زخم های کوچک متعدد دردناک در ناحیه کام نرم از ۲ روز قبل مراجعه نموده است. پزشک ایشان جهت کنترل تب بیمار، آسپرین تجویز کرده است ایشان سابقه ی زخم مشابه قبلی را ندارد. کدام عارضه در بیماران محتمل تر است؟ (بورد ۱۴۰۱)

- الف) انسفالوپاتی
ب) اختلال کلیوی
ج) راش پوستی
د) خونریزی بینی

۷۰- محتمل ترین تشخیص برای خانم ۵۴ ساله که به دلیل تاول های پوستی سالم و زخم های متعدد با درد کم داخل دهانی از ۶ ماه پیش مراجعه نموده است چیست؟

- الف) Bullous pemphigoid
ب) linear IgA Disease
ج) cicatrical pemphigoid
د) pemphigus vulgaris

۷۱- در یک بیمار دچار ضعف ایمنی وجود یک زخم نکروتیک منفرد، بزرگ، دردناک که از هفته ها قبل در دهان وی حضور دارد و موجب exfoliation دندان پره مولر فک پایین شده است، عفونت با کدام ویروس مطرح است؟ (بورد ۹۰)

- الف) HSV
ب) VZV
ج) EBV
د) HHV_۸

۷۲- تمام موارد زیر در سندرم بهجت دیده می‌شود به جز: (بورد ۹۱)

- الف) درگیری سیستم عصبی مرکزی
 ب) التهاب مشیمه
 ج) درگیری مفاصل کوچک
 د) زخم روده‌ای

۷۳- در کدام یک از بیماری‌های اتوایمیون، ضایعات پوستی به صورت مرکزی به سمت تنه و به طور قرینه گسترش پیدا می‌کند؟ (بورد ۹۱)

- الف) لیکن پلان
 ب) اریتم مالتی فرم
 ج) BP
 د) EBA

۷۴- معمولاً کدام یک از ویروس‌ها هرپس در ایجاد بیماری مادرزادی نقش دارند؟ (بورد ۹۱)

- الف) CMV
 ب) HSV_۱
 ج) HHV_۶
 د) EBV

۷۵- تمام موارد زیر می‌تواند از نشانه‌های PNP باشد به جز؟ (بورد ۹۱)

- الف) تاوُل کف دست‌ها و پاها
 ب) پاپول‌های خارش‌دار روی پوست
 ج) دلمه‌های خونریزی دهنده روی لب‌ها
 د) ضایعات تنها در قسمت قدامی دهان

۷۶- Post herpetic neuralgia : (بورد ۹۲)

- الف) یکی از عوارض نادر زونا است.
 ب) با تجویز فوسکارنت درمان می‌شود.
 ج) ناشی از آسیب به اعصاب مرکزی و محیطی می‌باشد.
 د) معمولاً همراه با فلج یل است.

۷۷- شایع‌ترین درماتوز زیر اپی تلیالی تاوُلی کدام است؟ (بورد ۹۲)

- الف) سیکاتریال پمفیگوئید
 ب) BP
 ج) LAD
 د) بیماری بلوز مزمن کودکی

۷۸- احتمال بروز سندرم استیون جانسون به دنبال کدام یک کمتر است؟ (بورد ۹۲)

- الف) عفونت HSV
 ب) عفونت پنومونی میکوپلاسمایی
 ج) مصرف Nsaid
 د) ضد تشنج

۷۹- کدام یک از عفونت‌های قارچی زیر ممکن است همراه EM دیده شود؟ (بورد ۹۲)

- الف) کریپتوکوکوس
 ب) کوکسیدومایکوزیس
 ج) میکوپلازما
 د) موکورمایکوزیس

۸۰- نمونه‌های بیوپسی پوستی در کدام یک از بیماری‌های زیر مملو از ائوزینوفیل است؟ (بورد ۹۲)

- الف) پمفیگوئید غشای مخاطی
ب) پمفیگوس ولگاریس
ج) پمفیگوئید بلوز
د) پمفیگوس وژتانس

۸۱- وزیکول‌ها و بول‌های خوشه‌ای مانند، روی زمینه‌ی ملتهب، مشخصه کام‌یک از بیماری‌های تاولی زیر است؟

(بورد ۹۲)

- الف) LAD
ب) پمفیگوئید خوش‌خیم کودکان
ج) پمفیگوئید بلوز
د) پمفیگوئید غشای مخاطی

۸۲- احتمال بروز آنکیلوگلوسیا در کدام بیماری مطرح می‌باشد؟ (بورد ۹۲) و (بورد ۹۳)

- الف) اپیدرمولیزیس بولوزا
ب) پمفیگوس
ج) LGA خطی
د) پمفیگوس پارانتوپلاستیک

۸۳- تمام موارد زیر از خصوصیات ضایعات داخل دهانی هرپس عودکننده در بیماران immunocompe-

tent می‌باشد به جز: (بورد ۹۲)

- الف) زخم منفرد یا خوشیه‌ای
ب) در مخاط کراتینیزه روی می‌دهد
ج) در مخاط غیر کراتینره روی می‌دهد.
د) دردناک می‌باشد.

۸۴- در کدام یک از بیماری‌های زیر تست پاتورژی مثبت است؟ (بورد ۹۳)

- الف) استوماتیت آفتی
ب) پمفیگوس ولگاریس
ج) سندرم بهجت
د) لیکن پلان

۸۵- در مبتلایان به (ANUG) NUG، تمام موارد زیر می‌تواند توجیه‌کننده زمینه ضعف ایمنی باشد، به جز:

(بورد ۹۳)

- الف) تب بالا
ب) لنفادنوپاتی منتشر
ج) ضعف پیشرونده
د) سوزش شدید و بوی بد دهان

۸۶- تست تشخیصی جهت عفونت فعال CMV کدام است؟ (بورد ۹۳)

- الف) کشت بافت
ب) تیترا CMV- Ab
ج) بیوپسی
د) DNA Hybrid

۸۷- پسر ۱۴ ساله از دیروز دچار تب، احساس کسالت و بوی بد دهان شده است. در معاینه زخم‌های کوچک آفت مانند در کام سخت، مخاط لب بالا و پایین و سطح دورسال زبان دیده می‌شود، لته پالاتال ناحیه‌ی قدامی بیمار ملتهب و دردناک است. اگر بیمار سابقه‌ی علائم مشابه را در گذشته ذکر نکند، تجویز کدام

داروی زیر برای علائم وی مناسب تر از بقیه است؟ (بورد ۹۴)

الف) آسیکلوویر ب) دهانشویه بتامتازون ج) قطره نیستاتین د) آسپرین

۸۸- همه عبارات زیر در ارتباط با عفونت هرپس زوستر صحیح هستند، به جز: (بورد ۹۴)

- الف) منجر به افزایش گذرا در سطح سرمی IgM می شود که فاقد ارزش تشخیصی است.
 ب) تظاهرات فکی ناشی از مصرف بیس فسفونات در تشخیص افتراقی با موارد شدید این بیماری مطرح می باشد.
 ج) فقدان یک طرفه حس چشایی در ۲/۳ قدامی زبان و فلج بل بعد از تظاهرات شایع آن است.
 د) واکنش‌های پس از عفونت (post herpetic neuralgia) در کاهش وقوع post herpetic neuralgia بی اثر است.

۸۹- مرد ۲۷ ساله به علت زخم‌های دردناک عودکننده مراجعه کرده است. در معاینه دو زخم کوچک نیم سانتی و یک زخم ۱/۵ cm در کام نرم و چین‌های لوزه دیده می شود به گفته بیمار، زخم‌ها طی دو هفته گاهی ۲ ماه بهبود می یابند. علاوه بر این، چند کانون متورم، سرخ و دردناک در پوست پا وجود دارد. بررسی تمام موارد زیر در این بیمار قابل توصیه است به جز: (بورد ۹۴)

الف) سابقه تورم مفاصل به ویژه مفاصل بزرگ ب) وجود HLA-B_{۲۷}
 ج) بررسی علائم گوارشی تازه د) تست پاترژی

۹۰- خانم ۵۶ ساله از ۳ ماه پیش دچار ضایعات دهانی شده است. در معاینه، زخم‌های map-like پوشیده از غشاء فیبرینی در گونه و کام و یک تاول سالم در کف دهان دیده می شود. علاوه بر این چند تاول و پاپول خارش دار به صورت خوشه‌ای در آرنج و زانو وجود دارد که چند روز قبل از ضایعات دهانی ایجاد شده‌اند. محتمل ترین تشخیص کدام است؟ (بورد ۹۴)

الف) بیماری IgA مخاطی ب) پمفیگوبید مخاطی
 ج) پمفیگوبید بلوز د) اپی درمولیز بلوز اکتسابی

۹۱- خانم ۵۴ ساله از دو ماه پیش به دنبال خوردن غذا و مسواک زدن دچار سوزش لثه می شود. در معاینه، قرمزی لثه و دو زخم بزرگ با حاشیه نامنظم و اریتماتوز پوشیده از غشای فیبرینی در کام دیده می شود. بیمار اخیراً از سوزش ناحیه‌ی تناسلی نیز شاکی است ولی پوست وی سالم می باشد. در بررسی هیستوپاتولوژیک، شکاف زیر اپی تلیال و در بررسی ایمونوفلورسنت مستقیم رسوب IgG و C۳ در ناحیه غشای پایه مشاهده شده‌اند. همه عبارات زیر، با توجه به محتمل ترین تشخیص صحیح است. به جز: (بورد ۹۴)

- الف) ارجاع بیمار جهت رد بیماری بدخیم زمینه‌ای، توصیه می شود.
 ب) یکی از عوارض درگیری چشم در این بیماری، کاهش یا فقدان ترشح اشک است.
 ج) تجویز داپسون در مبتلایان به شکل شدید ضایعات دهانی یا در صورت درگیری حنجره توصیه می گردد.
 د) تست ایمونوفلورسنت غیر مستقیم در اکثر بیماران مثبت است ولی با شدت بیمار ارتباط ندارد.

۹۲- تمام موارد جزء عوامل مستعدکننده پست هرپتیک نورالژیا محسوب می شوند به جز: (بورد ۹۵)

الف) سن بالاتر از ۵۰ سال در زمان بروز زوستر

ب) شدت بیماری در فاز حاد زوستر

ج) محل (درماتوم) درگیری

د) وجود درد در فاز پیش رس بیماری

۹۳- برای خانم ۳۰ ساله‌ی متاهل، به علت ابتلا به آفت‌های مازور مقاوم به درمان، تالیدومید تجویز شده

است. کدام مورد ضرورت دارد؟ (بورد ۹۵)

الف) ارزیابی ماهانه ذخایر آهن

ب) درخواست ادواری CBC برای بررسی سایتوپنی

ج) تأکید بر استفاده همزمان از دو روش ضد بارداری

د) معاینه دوره‌ای دهان جهت کشف زودهنگام ابتلا به نئوپلاسم

۹۴- در کدام بیماری، ویروس هرپس سیمپلکس در مایع Endoneurial اغلب مبتلایان قبل ردیابی است؟

(بورد ۹۶)

الف) هرپس اولیه ب) هرپس ثانویه ج) اریتم مالتی فرم د) فلج بل

۹۵- بیماری ۲۲ ساله مبتلا به لوسمی و سابقه پیوند مغز استخوان با ضایعات شبه آفتی متعدد دهان همراه

با زخم‌های اقماری کوچک مراجعه کرده است. روش استاندارد برای تشخیص ضایعات کدام است؟ (بورد ۹۷)

الف) کشت ب) Anti body test ج) بیوپسی د) RealtimePCR

۹۶- آقای ۶۰ ساله مبتلا به لنفوم به علت درد شدید ناشی از زخم‌های وسیع و منتشر دهان و کراست‌های

خونریزی دهنده لب‌ها مراجعه نموده است. ضایعات تاولی پوستی به‌خصوص در کف دست و پاها جلب توجه

می‌نمود. محتمل‌ترین تشخیص چیست؟ (بورد ۹۷)

الف) توکسیک اپیدرمال نکرولیز ب) پمفیگوس پارائتوپلاستیک

ج) هرپس مزمن د) موکوزیت ناشی از شیمی‌درمان

۹۷- تمام موارد زیر جزء خصوصیات عفونت هرپس عودکننده exteranenal است به جز: (بورد ۹۸)

الف) ایجاد فلج bell's ب) بروز در لبه

ج) فقدان علائم پرودرمال د) مقاومت به درمان موضعی